



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmani istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

*Bu içlik vərəqəni saxlayın. Daha sonra onu təkrar oxumağa ehtiyac duya bilərsiniz.
Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizi və ya aczaçıya müraciət edin.*

Bu dərman xüsusi olaraq Sizin üçün yazılmışdır, onu başqalarına verməyin.

Bu dərmandan istifadə zamanı həkimə və ya xəstəxanaya müraciət etsəniz həkiminizi bu dərmandan istifadə etdiyinizi söyləyin.

Bu təlimatda yazılınlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizə tövsiyə olunan dozasını artıraraq və ya azaldaraq istifadə etməyin.

GENOPRİL 5 mq tabletlər

GENOPRIL

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ramipril

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 5 mq Ramipril vardır.

Köməkçi maddələr: HPMC E5, mikrokristallik sellüloza, laktosa monohidrat, kroskarmelloza natrium, prejelatinləşdirilmiş nişasta, natrium bikarbonat, natrium stearil fumarat

Təsviri

Girdə və bir üzündə kəsik xətti olan ağ və ya ağa yaxın tabletlardır.

Farmakoterapevtik qrupu

Angiotenzinçevirici fermentin (AÇF) inhibitoru.

ATC kodu: C09AA05.

İstifadəsinə göstərişlər

- Hipertensiya,
- Durğunluq ürək çatışmazlığı,
- Miokard infarktı, insult və kardiovaskulyar mənşəli ölüm riskinin azaldılması.
- Diabetik və qeyri-diabetik nefropatiya.

Əks göstərişlər

- Təsdiq edilmiş hamiləlik. Hamiləlik təsdiq edilərsə, tez bir zamanda AÇF inhibitoru ilə müalicəni dayandırılmalıdır, çünki AÇF inhibitorları hamiləliyin ikinci və üçüncü trimestrlərində istifadə edildikdə dölnün və ya yenidoğulmuşun zədələnməsinə, hətta ölümünə səbəb ola bilər.
- Ramiprilə və ya hər hansı bir AÇF inhibitoruna qarşı yüksək həssaslıq.
- AÇF inhibitorundan istifadə zamanı angionevrotik ödəm meydana çıxarsa.

- Böyrək arteriyalarının stenozu.
- Ürək qan dövranına təsir göstərən ürək probleminin olması (məsələn, aorta və ya mitral qapağın stenozu).
- Qan təzyiqinin aşağı düşməsi nəticəsində tez oturub-durma zamanı başgicəllənmənin baş verməsi.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

GENOPRİL-dən aşağıdakı hallarda ehtiyatla istifadə edin:

- Keçmişdə həşarat dişləməsi və sancması ilə bağlı güclü allergik reaksiyalar keçirmisinizsə, bu allergik reaksiyanın əlamətləri övrə, udma və ya nəfəsalma problemləri, dodaqların, üzün, boğazın və dilin ödəmidir (şisməsi).
- Dializ membranlarının təsirindən allergiya nəticəsində üz və boğazın ödemi baş verərsə,
- Hipertensiya varsa, aşağıdakı xəstə qrupları müşahidə edilməlidir:
 - Maye və ya duz çatışmazlığı varsa və ya onların meydana çıxma ehtimalı varsa,
 - Diareya və ya qusma baş verərsə,
 - Dializ xəstəsinizsə,
 - Durğunluq ürək çatışmazlığınız varsa, qan təzyiqinizin hiss edilə biləcək, aydın ifadə olunmuş düşməsi və böyrək funksiyalarının pozulması ehtimalınız artar,
 - Qaraciyər çatışmazlığınız varsa, həkimə müraciət etməlisiniz, çünki müalicənin gedisi zamanı sarılıq baş verərsə və ya qaraciyər fermentlərinin səviyyəsinin yüksəlməsi ehtimalı varsa, müalicənin gedişində bu baxımdan qiymətləndiriləcəksiniz.
 - Böyrəklərinizdə funksional pozğunluq varsa,
 - Qaraciyərinizdə pozğunluq varsa.

Bu hallar hətta keçmişdə olsa belə Sizi aiddir, lütfən həkiminizi bildirin.

GENOPRİL-in tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr haqqında mühüm məlumatlar

GENOPRİL-in tərkibində olan köməkçi maddələrə qarşı yüksək həssaslığınız yoxdur, bu maddələrlə bağlı arzuolunmaz təsir gözlənilmir.

GENOPRİL-in hər dozasında 0,044 mq natrium vardır. Bu miqdardan yüksək dozadan (23 mq) aşağı olduğu üçün heç bir əlavə təsir gözlənilmir.

Digər dərman maddələri ilə qarşılıqlı təsiri

GENOPRİL ilə digər dərman maddələrinin qarşılıqlı təsiri, xüsusilə aşağıdakı dərmanlardan hər hansı biri ilə müalicə olunduğunuz zaman çox önemlidir: qeyri-steroid iltihabəleyhinə maddələr (aspirin, ibuprofen və ya indometasin kimi), diuretiklər (spirinolakton, triamteren, amilorid, bendrofluazid və ya furosemid kimi), kalium duzları və kaliumtutucu diuretikler, heparin (qan durulaşdırıcı (antikoagulyant)), litium, peroral hipoqlikemik preparatlar (stüfonilsidikcövhəri törəmələri) və insulin (şəkarlı diabet zamanı istifadə olunur). Çünki GENOPRİL bu dərmanların təsirini dəyişdirə bilər.

Ayrıca efedra, yoximbin, sarımsaq və jenşen preparatları ilə birlikdə istifadə etməyin.

GENOPRİL-in aşağıdakı laborator göstəricilərə təsiri barədə də məlumat verilmişdir.

Kreatinin və qan sidik cövhəri azotunu səviyyəsinin yüksəlməsi gözlənilə bilər.

Hemoqlobinin və hematokritin səviyyəsində nadir olsa da azalma gözlənilə bilər.

Qaraciyər fermentlərinin, zərdab bilirubinin, sidik turşusunun və sidikdə qlükozanın səviyyəsinin yüksəlməsi.

Nadir hallarda olsa da, leykopeniya, eozinofiliya və proteinuriya kimi qarşılıqlı təsirlər baş verə bilər.

Əgər reseptlə və ya reseptsiz buraxılan hər hansı dərman istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, lütfən, bu barəda həkiminizi və ya əczaçınızı məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin.

Müalicə vaxtı hamiləlik təsdiq edilərsə, GENOPRİL ilə müalicəni dərhal dayandırmalısınız.

Müalicə dövründə hamilə olduğunuzu hiss etsəniz, bunu dərhal həkiminizi və ya əczaçıya bildirin.

Laktasiya

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin.

Əgər uşaq əmizdirirsizsə, GENOPRİL qəbul etməyin.

Təkrar dozalar ana südündə preparatın toplanmasına səbəb ola biləcəyindən, südəmər uşağı olan analar preparatdan istifadə etməməlidir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
GENOPRİL-dən istifadə zamanı nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə edərkən diqqətli olmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozası

Həkiminiz başqa cür tövsiyə verməzsə bu təlimata əməl edin.

GENOPRİL, oral qəbul üçündür, çeynənilmədən müəyyən qədər su ilə udulmalıdır.

Miokard infarkti, insult və kardiovaskulyar mənşəli ölüm riskini azaltmaq üçün: ilk bir həftə ərzində başlangıç doza kimi gündə 2,5 mq qəbul edilməlidir. Sonrakı 3 həftədə doza 5 mq-a çatdırılır. Xəstə dözümlülük göstərə bilirsə, gündə 10 mq dozada dəstəkləyici müalicəyə keçilir.

Hipertensiya: diuretik qəbul etməyənlər üçün üçün tövsiyə olunan doza 2,5 mq-dır. Qan təzyiqinin müalicəyə cavabından asılı olaraq doza 2,5-10 mq arasında birdəfəlik doza (tək doza) şəklində və ya iki bərabər hissəyə bölünməklə istifadə edilir.

Miokard infarkti sonrası ürək çatışmazlığı: bu halda GENOPRİL gündə iki dəfə 2,5 mq dozada təyin edilir. Bu doza hipotenziyaya səbəb olarsa, doza gündə 2 dəfə 1,25 mq şəklində istifadə olunur. Əgər xəstə dözümlülük göstərərsə, məqsədə uyğun dozanın titrlənməsi (3 həftə ərzində saxlanılır) gündə 2 dəfə 5 mq-dır. İcazə verilən ən yüksək gündəlik doza 10 mq-dır.

Müxtəlif yaş qrupları

Uşaqlarda istifadəsi

Uşaqlarda istifadəsinin təhlükəsizliyi və effektivliyi öyrənilməmişdir. Ona görə də uşaqlarda istifadəsi tövsiyə olunmur.

Yaşlılarda istifadəsi

Həkiminiz müalicəni 1,25 mq aşağı doza ilə başlaya bilər, müalicənizdən asılı olaraq dozani yavaş-yavaş yüksəldəcəkdir.

Xüsusi pasientlər qrupunda istifadəsi

Diuretik alan xəstələrdə istifadəsi

Bir diuretik müalicəsi alan xəstələrdə müalicəyə GENOPRİL-in əlavə edilməsi xəstədə simptomatik hipotenzianın yaranmasına səbəb ola bilər. Simptomatik hipotenzianın başvermə imkanını azaltmaq üçün GENOPRİL ilə müalicəyə başlamazdan 2-3 gün əvvəl diuretiklə müalicəyə ara verilməlidir. Əgər qan təzyiqi tək başına GENOPRİL istifadə edilməklə nəzarət altına alına bilməzsə müalicəyə diuretik əlavə edilə bilər.

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə istifadəsi

Hipertensiya və böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə başlangıç doza kimi gündə 1 dəfə 1,25 mq GENOPRİL tövsiyə edilir. Qan təzyiqini nəzarət altına ala bilmək üçün maksimum gündəlik doza 5 mq-a qədər çatdırilla bilər. Ürək çatışmazlığı və böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə tövsiyə edilən başlangıç doza gündə 1 dəfə 2,5 mq-dır. Doza maksimum gündə 2 dəfə 5 mq-a qədər artırıla bilər.

Qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə istifadəsi

Həkiminiz müalicəyə gündə 1,25 mq-lıq aşağı doza ilə başlamalı və müalicənizi yaxından izləməlidir.

Əgər Sizdə GENOPRİL-in təsirinin çox güclü və ya zəif olması barədə şübhə yaranarsa, həkiminizlə və ya əzəcəinizlə məsləhətləşin.

GENOPRİL-in qida və içkilərlə birlikdə qəbulu

Qida və içkilərin GENOPRİL-in qəbuluna təsiri yoxdur.

GENOPRİL ilə müalicə alarkən eyni zamanda alkoqollu içkilər qəbul edilməməlidir

GENOPRİL-i qəbul etməyi unutmusunuzsa

Əgər GENOPRİL qəbul etməyi unutmusunuzsa və növbəti dozani qəbul etmə zamanı deyilsə xatırlayan kimi unutduğunuz dozani qəbul edin.

Unudulan dozani əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin.

GENOPRİL ilə müalicənin dayandırılması zamanı baş verə biləcək təsirlər

Həkiminizin göstərişi olmadan GENOPRİL-in istifadəsini dayandırmayın.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi, GENOPRİL-in tərkibində olan maddələrə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxıbilər.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, GENOPRİL-in qəbulunu dayandırın və dərhal həkiminize məlumat verin və ya Sizə ən yaxın olan xəstəxananın tacili yardım şöbəsinə müraciət edin

Şiddətli allergiya olduğunu göstərən hallar varsa: üzdə, boğazda, dodaqda udmanı və nəfəsalmanı çatınlasdırıcı dərəcədə şişkinlik (odem) və onunla birlikdə övrə və qızartı varsa,

Dodaqlar, gözlər, ağız, burun və cinsiyyət orqanlarının ətrafında qanaxma və ya şişkinlik, qripəbənzər simptomlar və qızdırma varsa (Stivens-Conson sindromu).

Bunların hamısı çox ciddi əlavə təsirlərdir.

Əgər bunlardan biri sizdə mövcuddursa, bu, Sizin GENOPRİL-ə qarşı ciddi allergiyanızın olması deməkdir.

Təcili tibbi müdaxilə və ya xəstəxanaya yerləşdirilməyiniz lazımlı gələ bilər.

Bu çox ciddi əlavə təsirlərin hamısı olduqca nadir hallarda baş verir.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, dərhal həkiminize məlumat verin və ya Sizə ən yaxın olan xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət edin

Mədənizdə və ya kürayinizdə güclü ağrı olarsa, bu, mədəaltı vəzinin iltihabına işaret ola bilər.

Yüngül gəyərmə və normadan artıq qanaxma, dişəti qanaxması və ya dəridə qançır və ya ləkə varsa, nor-madan daha tez-tez infeksiyaya yoluxursunuzsa, boğazda iltihab və istilik varsa, bu simptomlar sümük iliyinin problemlərini və qanazlılığını aid problemləri göstərir.

Son iki-üç gündə təngnəfəslik, öksürök, yüksək qızdırma, açılıq hissinin azalması, ağciyər iltihabı da daxil olmaqla ağciyər problemlərinin simptomları ola bilər.

Yüksək temperatur, yorğunluq, iştahsızlıq, mədə ağrısı, halsizliq, gözlərdə və üzdə saralma hepatit (qaraciyərin iltihabı) və ya qaraciyər çatışmazlığının simptomları ola bilər.

Əllərin, ayaqların və topuqların şısması,

Dəridə qabarlı səpgilərin yaranması ilə bütün bədəndə geniş açıq yaralar əmələ gələ bilər. Özünüzü yaxşı hiss etməyə bilərsiniz, qızdırma və ya üşütmə və əzələlərdə ağrı baş verə bilər.

Yüksək temperatur, qan damarlarının iltihabı, əzələ və oynaq ağruları, qan analizi ilə təsdiq edilmiş qan xəstəlikləri, dəri səpgisi, günəş işığına qarşı həssaslıq və dəriyə digər təsirlər varsa, vaskulit adlandırılaraq xəstəliyiniz ola bilər.

Ürək yiğilmalarının tezliyinin artması, qeyri-ritmik və ya güclü ürək yiğilməleri, döş qəfəsində ağrı, ürək çırıntıları və ürək tutması və şok kimi ciddi hallar varsa.

Bunların hamısı ciddi əlavə təsirlərdir. Təcili tibbi müdaxilə lazımlı gələ bilər.

Ciddi əlavə təsirlər çox nadir hallarda baş verir.

Aşağıdakılardan hər hansı birini hiss etsəniz, həkiminize söyləyin:

ani yüksək həssaslıq baş verərsə,

qan hüceyrələrinin sayında və ya ağ qan cisimciklerinin sayıda azalma baş verərsə,

qanda kaliumun səviyyəsinin yüksəlməsi,

görmə və eşitmə qabiliyyətinizdə dəyişmə,

topuğun şısması,

quru öksürök,

yuxusuzluq, əsəbilik, şüurun dumanlanması, depressiya, əhvalın pozulması, süstlük, narahatlıq və yuxuyameyillik,

ürəkbulanma, başgicəllənmə, halsizliq,

dadbılma və iyibilmə hissinin dəyişməsi,

qulaqlarda cingilli, yorğunluq və tərləmə,

günəş şüalarına qarşı yüksək həssaslıq,

cavab reaksiyasının ləngiməsi,

qan təzyiqinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq müvəzinət problemi, bayılma, ani ayağa qalxdıqda başgicəllənmə kimi durumlar,

baş ağrısı,

nasazlıq, qızdırma,

burun axması, boğazda ağrı, xırılıt, nəfəsalmanın çətinləşməsi, təngnəfəslik, aşırıma və burun tutulması (bu simptomlar rinit adlandırılır)

nəfəsalmanın çətinləşməsi, təngnəfəslik,

qaşınma, övrə səpgisi,

gözün iltihabı,

qabar tördən və ya törətməyən dəri səpgiləri,

səçlərin və ya dirnaqların tökülməsi,

Qusma, həzmin çətinləşməsi, ishal, qəbizlik, iştahsızlıq, ağızın quruluğu, mədə ağrısı, dilin, dişətinin və boğazın iltihabı,

bağırsaq və mədə xorası, ürəkbulanma vəziyyətləri (yanğı hissini və ağrıya səbəb ola bilər.)

mədə ağrısı, ürəkbulanma və yaqusma kimi simptomlar (bu simptomlar bağırsaq angionevrotik ödeminizi olduğunu göstərə bilər)

əzələ qıçılmları,
ereksiyanın və spermatogenezin çətinləşməsi,
sidik ifrazının artması,
dəridə normal olmayan uyuşmalar, sancma hissi, yandırıcı hiss,
soyuqda və ya təzyiq altında ayaq və əl barmaqlarınızda rəng dəyişikliyi, ayrıca soyuqda ayaq və əl barmaqlarınızda ağrı, istidə isə ağrı və qarışqa gəzməsi hissi kimi əlamətlər – bu əlamətlər Reyno sindromunun ola biləcəyini göstərir.

Bunlar GENOPRİL-in zəif əlavə təsirləridir.

Əgər bu içlik vərəqədə (istifadə üçün talimatda) qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Qan analizi: GENOPRİL qan analizinin nəticələrinə təsir göstərə bilər. GENOPRİL-in təsir göstərdiyi analizlər bunlardır: qan hüceyrələri və digər elementləri, kaliumun, kreatininin və ya sidik cövhərinin, natriumun, qaraciyər fermentlərinin və ya bilirubinin səviyyəsi. Əgər qan analizi verəcəksinizsə, həkiminizi GENOPRİL istifadə etdiyinizi söyləyin.

Doza həddinin aşılması

Əgər lazıム olduğundan artıq miqdarda GENOPRİL qəbul edilərsə, dərmanın arzuolunmaz təsirləri və təsir gücü arta bilər.

Əgər lazıム olduğundan artıq miqdarda GENOPRİL qəbul etmisinizsə, həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Buraxılış forması

14 tablet blisterdə. 2 blister, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, orijinal qutusunda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Yararlılıq müddətinin bitmə tarixi göstərilən ayın son gününə şamil edilir.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş., Türkiye
ASO 2. ve 3. OSB Alçı OSB Mah. 2013 Cad. No.24 Sincan/ANKARA

Lisenziyanın sahibi

Gen İlac ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.Türkiye
Mustafa Kemal Mah., 2119.Sok. No:3 D:2-3 06520, Çankaya/ANKARA.