



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəsini diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

- Bu içlik vərəqəsini atmayın. Daha sonra onu təkrar oxumağınız lazım gələ bilər.
- Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizi və ya əczaçıya müraciət edin.
- Bu dərman şəxsən Sizin üçün təyin edilmişdir, onu başqalarına verməyin.
- Bu dərmandan istifadə müddətində həkimə və ya xəstəxanaya getsəniz, həkiminizi bərmandan istifadə etdiyiniz barədə məlumat verin.
- Bu içlik vərəqədə yazınlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizin üçün tövsiyə olunan dozasından yüksək və ya aşağı doza istifadə etməyin.

İMPERİUM XL 40 mq/10 mq/25 mq örtüklü tabletler
IMPERIUM XL

Tərkibi

Təsireddi maddələr: 1 tabletin tərkibində 40 mq olmesartan medoksomil, 10 mq amlodipinə ekvivalent 13,88 mq amlodipin bezilat, 25 mq hidroxlorotiazid vardır.

Köməkçi maddələr: prejelatinləşdirilmiş nişasta, mikrokristallik sellüloza (Avisel 102), kroskarmelloza natrium, maqnezium stearat, kolloidal silisium dioksid, çəhrayı opadri II 85F25437.

Təsviri

Çəhrayı rəngli, oval formali örtüklü tabletlardır.

Farmakoterapevtik qrupu

Angiotenzin II reseptorlarının blokatorları, digər kombinasiyalar.

ATC kodu: C09DX03.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

İMPERİUM XL-in tərkibində 3 təsireddi maddə - olmesartan medoksomil, amlodipin (amlodipin bezilat şəklində) və hidroxlorotiazid vardır. Hər 3 maddə yüksək qan təzyiqinə nəzarət etməyə kömək edir.

- Olmesartan medoksomil, qan damarlarını genişləndirərək qan təzyiqini aşağı salan "angiotenzin II reseptorların antaagonistləri" adlı bir dərman qrupuna aiddir.
- Amlodipin, "kalsium kanallarının blokatorları" adlandırılan dərman preparatları qrupuna daxildir. Amlodipin də qan damarlarını genişləndirərək qan təzyiqini aşağı salır.
- Hidroxlorotiazid tiazid diüretikleri ("sidikqovucu tabletler") adlandırılan bir dərman qrupudur. Böyrəklərinizin daha çox sidik hasil etməsini təmin edərək, orqanizmindəki artı suyun xaric edilməsinə kömək edir və qan təzyiqini aşağı salır.

Bu maddələrin təsiri qan təzyiqinizin aşağı düşməsinə səbəb olur.

İstifadəsinə göstərişlər

İmperium XL yüksək qan təzyiqini aşağı salmaq üçün hipertoniyanın müalicəsində istifadə olunur.

- Qan təzyiqinə olmesartan medoksomil və amlodipinin fiksəolutunmuş dozada kombinasiyası ilə kifayət qədər nəzarət edilə bilməyən böyük xəstələrdə;
- Olmesartan medoksomil və hidroxlortiazidin fiksəolutunmuş kombinasiyası ilə birlikdə amlodipin qəbul edən və ya olmesartan medoksomil və amlodipinin fiksəolutunmuş kombinasiyası ilə birlikdə hidroxlortiazid qəbul edən xəstələrdə
Yüksək qan təzyiqinin aşağı salınması ölümə səbəb olan və olmayan kardiovaskulyar hadisələrin, xüsusilə də insult və miokard infarktinin yaranma riskini azaldır.

Əks göstərişlər

Aşağıdakı hallarda IMPERIUM XL-in istifadəsi əks göstərişdir.

Əgər,

Olmesartan medoksomil, amlodipinə və ya kalsium kanallarının blokatorlarının xüsusi bir qrupuna (dihidropiridinlər), hidroxlorotiazidə və ya hidroxlorotiazidə bənzər maddələrə (sulfonamidlər), yaxud bu dərmanın digər komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslığınıza varsa.

Ciddi böyrək problemlərinə varsa.

Şəkər xəstəliyiniz və ya böyrəklərinizin funksional pozğunluğu olmaqla birlikdə, eyni zamanda qan təzyiqini aşağı salan aliskiren tərkibli bir dərmanla müalicə alırsınızsa Qanınızda kaliumun, natriumun səviyyəsi aşağıdırsa, kalsiumun səviyyəsi yuxarıdırsa və ya sidik turşusunun (podaqra və böyrək daşı əlamətləri ilə) səviyyəsi yüksəkdirsa və onlar müalicə edildikdə yaxşılaşırırsa.

Hamiləsinizsə və ya uşaq əmizdirirsizsə (bax: "Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi"). Ağır qaraciyər probleminiz varsa, öd ifrazınız pozulmuşdur və ya öd kisəsindən öd axını pozulmuşdur (məsələn, öd daşlarına görə) və ya əgər Sizdə sarılıq (dərinin və gözlərin sarılması) varsa

Aşağı qan təzyiqi, aşağı nəbz, sürətli ürək döyüntüsü və ya şok (ürəklə bağlı problemlərə görə kardiogen şok daxil olmaqla) kimi səbəblərdən toxumalarda qan təchizatının azalması əlamətləri varsa

Qan təzyiqiniz çox aşağıdırsa.

Ürəyinizdən qan axını yavaş və ya tutuludursa (aorta stenozu). Bu, ürəyinizdən qan daşıyan damar və ya qapağın daralması halında baş verə bilər.

İnfarktdan (kəskin miokard infarktı) sonra hemodinamik cəhətdən qeyri-stabil ürək çatışmazlığı ürəyin vurğu həcmində azalma varsa. Ürəyin vurğu həcmimin aşağı olması təngnəfəsilik hiss etmənizə və ya ayaqlarınızda və topuğunuzda ödemə səbəb ola bilər.

Şəkərli diabet xəstəsinizsə və ya böyrək çatışmazlığınız varsa (YFS <60 ml /dəq / 1,73 m²) və yanaşı olaraq aliskiren istifadə edirsinizsə.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Yüksək qan təzyiqini müalicə etmək üçün istifadə olunan aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, həkiminizə bu barədə məlumat verin:

- Angiotenzinçevirici fermentin (ACF) inhibitoru (məsələn, enalapril, lisinopril, ramipril), xüsusilə diabetlə bağlı böyrək probleminiz varsa
- Aliskiren

IMPERIUM XL-i yüksək qan təzyiqinin müalicəsində istifadə olunan dərmanlarla birlikdə istifadə etmək tövsiyə edilmir. Həkiminiz bu dərmanları birlikdə istifadə etməyi mütləq tövsiyə edir, o, müntəzəm olaraq böyrəklərinizin fəaliyyətinə, qan təzyiqinə və qanınızdakı elektrolitlərin (məsələn, kalium) miqdarına nəzarət edə bilər.

ACF inhibitorları və angiotenzin II reseptorlarının blokatorları diabetik nefropatiyalı pasientlərdə eyni vaxtda istifadə edilməməlidir.

Ehtiyatla

Əgər,

- Böyrək probleminiz varsa və ya Sizə böyrək köçürülmüşdürə
- Qaraciyər xəstəliyi

- Ürək çatışmazlığı və ya ürəyin klapaları (qapaqları) və ya əzələləri ilə bağlı problemlər
- Güclü qusma və ya ishal varsa, yüksək dozada sidikqovucu tabletlərlə (diuretiklər) müalicə alırsınızsa və ya az miqdarda duzla pəhriz saxlayırsınızsa
- Hipovolemiya
- Hiponatriemiya
- Qanda kaliumun səviyyəsinin dəyişməsi
- Böyrəküstü vəzilərlə bağlı problemlər (böyrəkdə hormon hasil edən vəzilər)
- Şəkərli diabet
- Litium istifadə edirsinizsə
- Qırmızı qurdeşənəyi (autoimmün xəstəlik)
- Allergiya və ya astma
- Günsəş şüalarına məruz qaldıqdan və ya günəş vannaları qəbul etdikdən sonra günəş yanığı və ya səpgi kimi dəri reaksiyaları (hidroxlorotiazid qəbul edən pasiyentlərdə qeyri-melanom dəri xərçəngi riski mövcuddur).

Ciddi, davamlı və bədən kütləsinin itməsinə səbəb olan ishal ilə qarşılaşsanız, həkiminizlə əlaqə saxlayın. Həkiminiz simptomlarınızı qiymətləndirə və qan təzyiqinizin müalicəsi üçün dərmanlarını qəbulunu necə davam etdirəcəyinizi dair qərar verə bilər.

Qan təzyiqini aşağı salan bütün dərmanlarla olduğu kimi, ürək və ya beyində qan axını pozulan xəstələrdə qan təzyiqinin həddindən artıq düşməsi infarkta və ya insulta səbəb ola bilər. Buna görə həkiminiz qan təzyiqinizi diqqətlə yoxlayacaqdır.

IMPERIUM XL qanda yağın səviyyəsində və sidik turşusunun səviyyəsində artıma səbəb ola bilər (podaqra ilə əlaqədar oynaqlarda ağrılı şişkinlik). Həkiminiz bunları vaxtaşırı yoxlamaq üçün qan testi tələb edə bilər.

IMPERIUM XL, qanınızdakı elektrolit adlanan müəyyən kimyəvi maddələrin səviyyəsini dəyişdirə bilər. Həkiminiz vaxtaşırı nəzarət üçün qan analizləri tələb edə bilər. Elektrolit səviyyəsinin dəyişməsinin simptomları aşağıdakılardır: susuzluq, ağızda quruluq, əzələ ağrısı və ya spazmları, əzələlərdə yorğunluq, aşağı qan təzyiqi (hipotensiya), zəiflik hissi, yuxululuq, yorğunluq, yuxusuzluq və ya narahatlıq, ürəkbulanma, qusma, sidiyə getməyə ehtiyacın azalması, ürək döyüntülərinin sayının artması. Bu simptomları hiss etsəniz, bu barədə həkiminize məlumat verin.

Qalxanabənzər vəzinin funksiyası üçün test etməlisinizsə, bu testlər aparılmazdan əvvəl **IMPERIUM XL** qəbulunu dayandırmalısınız.

Hamilə olduğunuzu (və ya hamilə qala biləcəyinizi) düşünürsünüzsə, bu barədə həkiminize söyləməlisiniz. **IMPERIUM XL**, hamiləliyin ilk mərhələlərində tövsiyə edilmir və əgər 3 aydan çox hamiləsinizsə, bu mərhələdə istifadə edilməməlidir, belə ki, bu, körpənizə ciddi zərər verə bilər (bax: "Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi").

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə (18 yaşdan aşağı) istifadəsi

IMPERIUM XL-in uşaqlarda və 18 yaşına çatmayan yeniyetmələrdə istifadəsi tövsiyə olunmur.

Bu xəbərdarlıqlar, keçmişdəki hər hansı dönmədə olmuş olsa belə, Sizin üçün keçərlidirsə, lütfən, bu barədə həkiminize məlumat verin.

***IMPERIUM XL**-in tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr barədə mühüm məlumatlar*

Preparatin tərkibində xəbərdarlıq tələb edən heç bir əlavə maddə yoxdur.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Aşağıda qeyd edilən dərman preparatlarından hər hansı birini istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, bu barədə həkiminize və ya əczaçıya məlumat verin:

IMPERIUM XL-in təsirini gücləndirə biləcəyi üçün, qan təzyiqini aşağı salan digər dərmanlar. Həkiminiz aşağıdakı halda dozani dəyişdirə və / və ya başqa tədbirlər görə bilər:

AÇF inhibitoru və ya aliskiren qəbul edirsinizsə (bundan başqa, "Əks göstərişlər" və "Xəbərdarlıqlar və ehtiyat tədbirləri" bölmələrinə baxın)

Litiumun (əhval dəyişikliyini və bəzi depressiya növlərini müalicə etmək üçün istifadə olunan dərman) **IMPERIUM XL** ilə eyni zamanda istifadəsi litiumun toksik (zəharlıyıcı) təsirinin güclənməsinə səbəb ola bilər. Birlikdə istifadəsi məsləhət görülmür. Əgər **IMPERIUM XL** ilə yanaşı Litium qəbul etməlisinizsə, həkiminiz qanınızda litiumun səviyyəsini ölçəcəkdir. CYP3A4 inhibitorları, CYP3A4 induktorları

Ürək ritminin pozulması zamanı və yüksək qan təzyiqini müalicə etmək üçün istifadə olunan diltiazem, verapamil.

Vərəmin və digər infeksiyaların müalicəsi üçün istifadə olunan rifampisin, eritromisin, klaritromisin

Daziotu (St. John's Wort, Hypericum perforatum), depressiyanın müalicəsi üçün istifadə olunan bitki mənşəli dərman

Qreypfrut və ya qreypfrut şirəsilə eyni vaxtda istifadəsi məsləhət görülmür.

Mədə və bağırsaqda qidaların hərəkətini artırmaq üçün istifadə olunan sizaprid

Yavaş ürək döyüntüsünü müalicə etmək və ya tərləməni azaltmaq üçün istifadə olunan difemanil

Malyariya zamanı istifadə olunan halofantrin

Beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan vinkamin VD.

Parkinson xəstəliyində istifadə olunan amantadin

Kalium əlavələri, tərkibində kalium olan duz əvəzediciləri, sidikqovucular (diuretik-lər), heparin (qanı durulaşdırmaq və qanın laxtalanmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan dərman), AÇF inhibitorları (qan təzyiqini aşağı salmaq üçün istifadə olunan dərmanlar), işlədicilər, steroidlər, adrenokortikotrop hormon (ACTH), karbenoksolon (ağız və mədə xoralarının müalicəsində istifadə olunan dərmanlar), penisillin (antibiotik), asetilsalisil turşusu kimi bəzi ağrıkösicilər ("aspirin") və ya salisilatlar. Bu dərmanlar IMPERIUM XL ilə eyni vaxtda istifadə edildikdə qanınızda kaliumun səviyyəsini dəyişdirə bilər.

IMPERIUMXL ilə eyni vaxtda istifadə edilən qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) (QSİƏP-lər ağrı, şişkinlik və artrit daxil olmaqla, iltihabın digər əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur) böyrək çatışmazlığı riskini artırıbilər. QSİƏP-lər IMPERIUM XL-in təsirini azalda bilər. Salisilatların yüksək dozlarının istifadəsi mərkəzi sinir sistemini toksik təsiri artırıbilər.

IMPERIUM XL ilə alkoqolun, barbituratların, yuxu dərmanlarının, trankvilizatorların və antidepressant dərmanların birlikdə istifadəsi ayağa qalxan zaman qan təzyiqinin qəfil enməsinə səbəb ola bilər.

Qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salan Kolesevelam hidroxlorid, IMPERIUM XL-in təsirini azalda bilər. Həkiminiz IMPERIUM XL-i Kolesevelam hidroxloriddən ən azı 4 saat əvvəl qəbul etməyi məsləhət görə bilər.

IMPERIUM XL-in təsirini bir qədər azalda bilən antasidlər (həzmin pozulması və ya qıçkırmaya zamanı istifadə olunan dərmanlar)

Baklofen və tubokurarin kimi müəyyən miorelaksantlar

Atropin və biperiden kimi antixolinergik dərmanlar

Kalsium əlavələri

Dantrolen (bədən temperaturunun ağır pozulmaları zamanı istifadə olunan infuziya)

İmmun reaksiyasına nəzarət etməklə orqanizminizin köçürülmüş orqanı qəbul etməsinə imkan verən takrolimus və siklosporin.

Simvastatin (qanda xolesterinin və triqliseridlərin səviyyəsini aşağı salmaq üçün istifadə olunur).

Aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanda istifadə etmisinizsə, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Tioridazin, xloropromazin, levomepromazin, trifluoperazin, siamemazin, sulpirid, amisüliprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol və ya haloperidol kimi bəzi psixiatrik pozğunluqların müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar.

Diazoksid və yüksək qan təzyiqinin (məsələn, beta blokatorlar, metildopa) müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar. IMPERIUM XL bu dərmanların təsirini dəyişdirə bilər.

Mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid və ya eritromisin inyeksiyaları kimi ürək ritmi problemlərinin müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar.

HIV/QIÇS-in müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar (məsələn, ritonavir, indinavir, nelfinavir).

Göbələk infeksiyalarının müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar (məsələn, ketokonazol, itrakonazol, amfoterisin).

Xinidin, hidroxinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, bepridil və ya tuskükotu preparatları kimi ürək xəstəliklərinin müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar

Amifostin, siklofosfamid və ya metotreksat kimi xərçəng xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar

Noradrenalin kimi qan təzyiqini yüksəldən və ürək yiğilmalarının tezliyini azaldan dərmanlar
Tetrasiklin və ya sparfloxasin adlanan antibiotiklər kimi infeksiyaların müalicəsi üçün istifadə edilən dərmanlar

Probenesid, sülfinpirazon və allopurinol kimi podaqranı müalicə edən dərmanlar

Xolestiramin və xolestipol kimi qanda yağ səviyyəsini aşağı salan dərmanlar

Metformin və ya insulin kimi qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salan preparatlar

Əgər hazırda resept əsasında və ya reseptsiz buraxılmasından asılı olmayaraq hər hansı digər dərman preparati istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıyı məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əgər hamiləsinizsə, hamilə ola biləcəyinizi düşünürsünüzsə və ya hamilə qalmağı planlaşdırırsınızsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin. Həkiminiz adətən hamilə qalmanızdan əvvəl və ya hamilə olduğunuzu bildiyiniz zaman Sizə IMPERIUM XL qəbul etməyi dayandırmağı məsləhət görəcək və IMPERIUM XL əvəzinə başqa bir dərman istifadə etməyi məsləhət görəcəkdir. IMPERIUM XL, hamiləliyin ilk mərhələlərində tövsiyə edilmir və hamiləlik 3 aydan çoxdursa, qəbul edilməməlidir, çünki hamiləliyin 3-cü ayından sonra istifadə olunarsa, döлə ciddi zərər verə bilər.

IMPERIUM XL ilə müalicə müddətində hamilə qaldığınızı hiss etsəniz, dərhal həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Laktasiya

Dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Uşaq əmizdirirsinizsə və ya əmizdirməyə başlamaq istəyirsinizsə, bunu həkiminizə bildirin. Uşaq əmizdirən analar üçün IMPERIUM XL tövsiyə olunmur və əgər uşağınızı əmizdirmək istəyirsinizsə, xüsusilə uşağınız yenidoğulmuş və ya vaxtından övvəl doğulmuşdursa, həkiminiz Sizin üçün başqa bir müalicə seçə bilər.

Əgər hamiləsinizsə, hamilə ola biləcəyinizi düşünürsünüzsə və ya hamilə qalmağı planlaşdırırsınızsa, bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan öncə bu barədə həkiminizə və ya tibb bacısına məlumat verin.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Yüksək qan təzyiqinə görə müalicə edilərkən, Siz yuxululuq, ürəkbulanma və ya başğecəllənmə hiss edə bilərsiniz. Bu baş verərsə, simptomlar yox olana qədər nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməyin. Məsləhət üçün həkiminizə müraciət edin.

Istifadə qaydası və dozasi

IMPERIUM XL-i həmişə həkiminizin Sizə söylədiyi şəkildə istifadə edin. Əgər əmin deyilsinizsə, həkiminizlə və ya əczaçı ilə dəqiqləşdirin. IMPERIUM XL-in gündəlik istifadə dozası gündə bir tabletdir.

Maksimal məsləhət görülən doza 1 tabletdir.

Istifadə qaydası

Tabletlər ac və ya tox qarına qəbul edilə bilər. Tableti bir qədər maye ilə udun (məsələn, bir stəkan su). Tableti çeynəmək olmaz. Tableti qreypfrutla birlikdə qəbul etməyin.

Əgər mümkünənən gündəlik dozanızı hər gün eyni zamanda qəbul edin, məsələn, səhər yeməyi vaxtı.

Müxtəlif yaş qrupları

Uşaqlarda istifadəsi

IMPERIUM XL-in 18 yaşdan kiçik uşaqlarda və yeniyetmələrdə istifadəsi tövsiyə olunmur.

Yaşlıarda istifadəsi

Əgər yaşınız 65 yaşdan yuxarıdırsa, qan təzyiqinizin həddindən artıq dərəcədə aşağı düşmədiyinə əmin olmaq üçün həkiminiz hər doza artımı zamanı qan təzyiqinizi müntəzəm

olaraq yoxlayacaqdır. Yaşlılar maksimal məsləhət görülən dozunu IMPERIUM XL-i gündə 1 tablet qəbul etdikdə, ehtiyatlı olmalıdır.

Böyrək çatışmazlığı

Yüngül və orta dərəcəli böyrək çatışmazlığı (KK 30-60 ml/dəqiqə) olan pasiyentlərdə 40 mq-lıq olmesartan medoksomilin istifadəsi məhduddur. Bu qrup pasiyentlərdə olmesartan medoksomilin məsləhət görülən dozası 20 mq-dır.

Qaraciyər çatışmazlığı

Yüngül qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparat ehtiyatla istifadə edilməlidir. Orta dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlərdə olmesartan medoksomilin maksimal gündəlik dozası 20 mq-dan artıq olmamalıdır.

Ağır dərəcəli qaraciyər çatışmazlığı zamanı preparatın istifadəsi eks göstərişdir.

Qara irqdən olan xəstələr

Qara irqdən olan xəstələrdə bəzi oxşar dərmanlar kimi, IMPERIUM XL-in qan təzyiqini aşağı salıcı təsiri zəif ola bilər.

IMPERIUM XL-in qida və içkilərlə istifadəsi

IMPERIUM XL ac və ya tox qarına qəbul edilə bilər.

IMPERIUM XL istifadə edən insanlar qreypfrut şirəsi və ya qreypfurt istifadə etməməlidirlər. Belə ki, qreypfrut şirəsi və ya qreypfrutun amlodipin təsiredici maddəsinin qanda səviyyəsini yüksəltməklə, IMPERIUM XL-in qan təzyiqini azaldıcı təsirinin gözlənilməz artmasına səbəb ola bilər. IMPERIUM XL qəbul edərkən alkoqolla bağlı ehtiyatlı olun, çünki bəzi insanlar yanaşı olaraq alkoqol qəbul edərkən vertigo da daxil olmaqla başgicəllənmə hiss edirlər. Bu hal Sizdə baş verərsə, alkoqol qəbul etməyin.

IMPERIUM XL-i istifadə etməyi unutsanız

Gündəlik almalı olduğunuz dozunu almağı unutsanız, ertəsi gün normal dərman dozınızı qəbul edin.

Unudulmuş dozani əvəz etmək üçün ikiqat doza istifadə etməyin.

IMPERIUM XL ilə müalicənin dayandırılması zamanı meydana çıxı biləcək təsirlər

Həkiminizin tövsiyəsi olmadan IMPERIUM XL-i istifadə etməyi dayandırmayın.

Bu dərmanın istifadəsi ilə bağlı başqa suallarınız olarsa, həkiminizə və ya əczaçıya müraciət edin.

Əgər IMPERIUM XL-in təsirinin çox güclü və ya zəif olduğuna dair bir müşahidəniz varsa həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi IMPERIUM XL-in tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxı bilər.

Bu əlavə təsirlərin əksəriyyəti yüngüldür və müalicənin dayandırılmasına səbəb olmur.

Əgər aşağıdakı hallardan hər hansı biri baş verərsə, IMPERIUM XL-i istifadə etməyi dayandırın və bu barədə həkiminizə məlumat verin və ya ən yaxın xəstəxananın tacili yardım şöbasına müraciət edin.

IMPERIUM XL ilə müalicə zamanı bütün bədənə yayılan, üzün, ağızın və / və ya qırtlağın (larinks) şişməsinə səbəb olan, qaşınma və ya dəri səpgisi ilə təzahür edən allergik reaksiyalar meydana çıxı bilər.

Əgər bu əlamətlər meydana çıxarsa, IMPERIUM XL-i istifadə etməyi dayandırın və dərhal həkiminizə müraciət edin.

Ciddi bayılma və ya huşun itməsi; çünki IMPERIUM XL, həssas şəxslərdə qan təzyiqinin çox aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.

Əgər bu əlamətlər meydana çıxarsa, IMPERIUM XL-i istifadə etməyi dayandırın və dərhal həkiminizə müraciət edin və düz uzanın, ayaqlarınızın altını dəstəkləyərək yuxarı qaldırın. Bunların hamısı çox ciddi əlavə təsirlərdir.

Əgər Sizdə bunlardan biri varsa, deməli, IMPERIUM XL-ə qarşı ciddi bir allergiyanız var. Tacili tibbi müdaxiləyə və ya xəstəxanaya yerləşdirilməyinizə ehtiyac ola bilər.

IMPERIUM XL üç aktiv (təsiredici) maddənin birləşməsidir. Aşağıdakı məlumatlar, birincisi IMPERIUM XL kombinasiyası ilə bağlı bu vaxta qədər məlumat verilən digər əlavə təsirləri və ikincisi, hər bir fərdi aktiv maddə ilə bağlı və ya iki maddənin birlikdə verildiyi zaman meydana çıxan əlavə təsirləri göstərir.

Əlavə təsirlərin baş verə biləcəyi bir çox xəstə haqqında təsəvvür yaratmaq üçün bu əlavə təsirlərin başvermə tezliyi "tez-tez", "bəzən", "nadir" və "çox nadir" kimi verilmişdir.

Tez-tez: 10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər.
Bəzən: 100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər.

Nadir: 1000 xəstənin birindən azında, lakin 10000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər.

Çox nadir : 10000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilər.

Məlum deyil: mövcud məlumatlara əsasən başvermə tezliyini müəyyən etmək mümkün deyil.

Aşağıda qeyd edilən əlavə təsirlər IMPERIUM XL-in istifadəsi ilə bağlı məlum olan digər əlavə təsirlərdir.

Bu əlavə təsirlər meydana çıxarsa, adətən yüngül dərəcədə olur və müalicənizi dayandırmağa ehtiyac olmur.

Tez-tez (10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər)

Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası; nazofaringit; sidikçixarıcı yolların infeksiyası; başgicəllənmə; baş ağrısı; ürək döyüntüsünün hiss olunması; aşağı qan təzyiqi; ürək-bulanma; ishal; qəbizlik; əzələ spazmi; oynaqlarda şışkinlik; sidiyəgetməyə çağırışlar; zəiflik; topuqda, ayaqlarda, qollarda, əllərdə və baldırlarda ödəm; yorğunluq; anormal laborator göstəricilər.

Bəzən (100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər)

Hiperkaliemiya, hipokaliemiya, ayağa qalxanda vertigo; başgicəllənmə; sürətli ürək döyüntüsü; huşunu itirmə hissi; üzün qızarması və istilik hissi; öskürək; ağızda quruluq; əzələ zəifliyi; erekxiya qabiliyyətinə malik ola və onu saxlaya bilməmək.

Aşağıdakı əlavə təsirlər, hər bir ayrı maddə ilə bağlı və ya iki maddə birlikdə istifadə edildikdə meydana çıxan əlavə təsirlərdir.

Bu günə qədər IMPERIUM XL ilə bağlı meydana çıxmamasına baxmayaraq, aşağıdakılardı IMPERIUM XL-in əlavə təsirləri ola bilər.

Cox tez-tez (10 xəstənin birində)

Hipertrigliceridemiya, hipercolesterinemiya, hiperurikemiya, ödəm.

Tez-tez (10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər)

Sidikçixarıcı yolların infeksiyası, hipokaliemiya, hiperkalsiemiya, hiponatriemiya, hipomaneziemiya, hiperxloremiya, hiperamilasemiya; bronxit, öskürək, təngnəfəslik; mədə və ya bağırısaq infeksiyası; quşma; qan şəkərinin artması; sidikdə şəkər; şüurun qarışması; yuxululuq hissi, başgicəllənmə, başağrı, palpasiya, qanaxını; burun axması və ya tutulması; boğaz ağrısı; qarın nahiyyəsində ağrı, ishal, ürəkbulanma, qəbizlik; qıçırma; mədə pozğunluğu; mədədə köp, qastroenterit; əzələ spazmi, oynaqlarda və ya sümüklərdə ağrı, topuqda şışkinlik; bel ağrısı; skelet ağrısı; sidikdə qan; qripəbənzər simptomlar; sinədə ağrı; ağrı, asteniya, yorğunluq, periferik ödəm, anormal laborator göstəricilər; görmənin pozulması (ikili görme və bulanıq görme daxil olmaqla).

Bəzən (100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər)

Trombositlər kimi tanınan qan hüceyrələrinin sayının azalması, bu, asanlıqla göyərmə ilə və ya uzun müddət qanaxma ilə nəticələnə bilər; anafilaktik reaksiya; iştahanın anormal azalması (anoreksiya); yuxu problemi, qıcıqlanma; həssaslıq; narahatlıq daxil olmaqla əhvalda dəyişiklik; "Kefsiz-lik" və ya depressiya; titrəmə; yuxunun pozulması; dadbilmə hissinin pisləşməsi; şüurunitməsi; toxinma (lamisə) hissinin azalması; sancma (iyəbatma) hissi; iştahanınitməsi; tremor; uzağı görməməyin pisləşməsi; vertigo, tinnitus (qulaqlarda küy); aritmiya, stenokardiya (sinədə ağrı və ya narahatlıq); hipotoniya, ortostatik hipotensiya; ağızda quruluq, nəfəs almaqdə çətinlik; səpgi; saçın tökülməsi; allergik dermatit, dərinin allergik iltihabı; dəridə qızartı, ekzantema; kiçik qanaxma səbəbindən dəridə purpura və ya qırızılımlı ləkə; dərinin rəngsizləşməsi; qırmızı qaşınan şışkinlik (övrə); güclü tərləmə; qaşınma; dəridə qabıqlanma; günəş yanığı və ya səpgi kimi, işığa qarşı dəri reaksiyaları; əzələ ağrısı; tez-tez sidiyə getmə, sidiyəgetmə ilə bağlı problem; gecə tacili olaraq sidiyəgetmə hissi; kişilərdə sinənin böyüməsi; erektil disfunksiya, cinsi istəyin azalması; üzün ödəmi; özünü pis hissətmə; bədən kütləsinin artması və ya azalması; zəiflik, ətraflarda ağrı.

Nadir (1000xəstənin birindən azında, lakin 10000xəstənin birindən çoxunda meydana çıxa bilər)

Ağızsuyu vəzilərinin şışması və ağrılı olması; ağ qan hüceyrələrinin (leykositlərin) sayının infeksiya riskini artırıb iləcək dərəcədə azalması; qırmızı qan hüceyrələrinin (eritrositlər) sayının azalması (anemiya); aplastik anemiya, sümük iliyyinin zədələnməsi, neyropeniya/aqranoulositoz; hiperkaliemiya; həyəcan; laqeydlik hissi (apatiya); qıçılma tutmaları; baxığınız əşyaların sarı görünməsi; ləkrimasiyanın azalması, gözlərdə quruluq; ksantopsiya; qan ləxtaları (tromboz və ya emboliya); ağciyərlərdə maye yiğilması; kəskin interstisial pnevmoniya; qan damarlarının və dəridəki kiçik qan damarlarının iltihabı; mədəaltı vəzidə iltihab; dəridə və gözlərdə sarılıq; öd kisəsinin kəskin iltihabı; angioödem, səpgi, oynaq ağrısı və əl və barmaqlarda soyuma, qırmızı qurde-şənəyinin bəzi əlamətləri; dəri qırmızı qurdeşənəyinin reaktivasiyası, dəridə qabıqlanma və qabarların əmələ gəlməsi, toksik epidermal nekroliz; əzələ zəifliyi, hərəkət pozğunluğu; kəskin böyrək çatışmazlığı, interstisial nefrit, böyrək çatışmazlığı; böyrəyin infeksion törədici iş bağlı olmayan (qeyri-infeksion) iltihabı; zəif böyrək funksiyası; qızdırma, süstlük.

Çox nadir (10000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilər)

Dərmanlara qarşı yüksək hössəsliq. Yüksək əzələ gərginliyi; əllərdə və ayaqlarda uyuşma; hipokloremik alkaloz, hipertoniya, kəskin ürək xəstəliyi, miokard infarktı; mədənin iltihabı (qastrit); dişətinin qalınlaşması; paralitik bağırsaq keçməzliyi, spruyabənzər enteropatiya; qaraciyərin iltihabı; allergik dəri səpgisi, multiformalı eritema, eksfoliativ dermatit, Kvinke ödemi, Stivens-Conson sindromu.

Məlum deyil

Qeyri-melonom dəri xərçəngi, ekstrapiramid pozğunluq, kəskin miopiya, bağlıbucaqlı qlaukom, xoriodidal effuziya.

Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı bir əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Əgər lazımlı olduğundan daha çox İMPERİUM XL almışınızsa, başgicallənmə, sürətli və ya yavaş ürəkdöyünmə və aşağı qan təzyiqinin bəzi simptomları ilə qarşılaşa bilərsiniz.

Əgər lazımlı olduğundan çox tablet qəbul etmişinizsə və ya bir uşaq təsadüfən bir neçə tablet udmuşdursa, dərhal həkiminizi və ya on yaxın xəstəxananın tacili yardım şöbəsinə müraciət edin və dərmanın qablaşdırmasını və ya bu içlik vərəqəsini özünüzlə götürün.

İMPERİUM XL-dən lazımlı olduğundan artıq miqdarda istifadə etmişinizsə, həkimlə və ya əczaçı ilə danışın.

Buraxılış forması

7 tablet, blisterdə. 4 blister, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı otaq temperaturunda, qablaşdırımda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti bitmiş və ya istifadə edilməmiş dərmanları çirkab sularına və möişət tullantılarının içərisinə atmayıñ. Onları hara atmaq lazımlı olduğunu əczaçıdan soruşun. Bu tədbirlər ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Əgər preparatda və ya qablaşdırımda hər hansı qüsür hiss etsəniz, İMPERİUM XL-i istifadə etməyin.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.,
ASO 2. ve 3. OSB Alçı OSB Mah. 2013 Cad. No.24 Sincan/ANKARA.

Lisenziyanın sahibi

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.,
Mustafa Kemal Mah., 2119.Sok. No:3 Balgat Çankaya/ANKARA.