

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoleji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E. M. Agayev
"19" aprel 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

Bu içlik vərəqəni saxlayın. Daha sonra onu təkrar oxumağa ehtiyaç duya bilərsiniz.

Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizi və ya aczaçınızı müraciət edin.

Bu dərman şəxsən Sizin üçün təyin edilmişdir, onu başqalarına verməyin.

Bu dərmandan istifadə zamanı həkima və ya xəstəxanaya müraciət etsəniz həkiminizi bu dərmandan istifadə etdiyinizi söyləyin.

Bu təlimatda yazılınlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizə tövsiyə olunan dozasını artıraraq və ya azaldaraq istifadə etməyin.

Əlavə təsirlərdən hər hansı biri ciddi xarakter alarsa və ya bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, lütfən həkiminizi və aczaçınızı bildirin.

RİDAKTON 100 mq örtüklü tabletlər

RIDACTONE

Tərkibi

Təsireddi maddələr: 1 tabletin tərkibində 100 mq spironolakton vardır

Köməkçi maddələr: kalsium sulfat dihidrat, kroskarmelloza natrium, laktosa monohidrat, krospovidon, qarğıdalı nişastası, HPMC 606, natrium laurilsulfat, kolloidal silikon dioksid, maqnezum stearat, Opadry (II).

Təsviri

Ağ rəngli, girdə, ikitərəfli qabarıq, bir üzündə bölmə xətti olan örtüklü tabletlərdir.

Farmakoterapeutik qrupu

Diuretik dərman preparatı.

ATC kodu: C03DA01.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Ridakton sidikqovucu (diuretik) dərman preparatları qrupuna aiddir.

Topuqlarınızda şışkinlik varsa və ya kasik-kasik nəfəs alırsınızsa həkimə müraciət edin. Bu vəziyyət orqanızminizdə maye miqdarının artması ilə bağlı olaraq ürəyinizin qanı qovma gücünün (nasos funksiyasının) zəifləməsi ilə əlaqədar ola bilər. Bu vəziyyət durğunluq ürək çatışmazlığı adlandırılır. Çoxlu mayenin orqanızminizdə dövr etməsi ürəyinizin çox işləməsi deməkdir.

Həkiminiz orqanızminizdə olan artıq mayeni orqanızminzdən xaric etmək üçün Sizə RİDAKTON təyin edəcəkdir. Ridakton istifadə etdiyiniz zaman sıdiyə getməyə daha çox ehtiyac duyacaqsınız. Beləliklə, artıq maye sıdiyinizlə xaric olacaqdır.

Istifadəsinə göstərişlər

Ridakton əsasən aşağıdakı halların müalicəsi üçün istifadə olunur:

Essensial hipertenziya (səbəbi məlum olmayan hipertenziya)
Nefrotik sindrom (orqanizmdə çoxlu miqdarda mayenin toplanmasına səbəb olan böyrək xəstəliyi)
Assit (məsələn, qarın boşluğununda qaraciyər sirrozunun səbəb olduğu maye toplanması)
Birincili aldosteronizm (Aldosteron hormonunun səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq orqanizmdə mayenin toplanması)
Diüretiklərlə birlikdə hipokaliemiya/hipomaqneziemiyənin (qanda kalium səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi) kompleks müalicəsində
Zəif-orta-ciddi simptomlarla müşahidə olunan ürək çatışmazlığının (NYHA II-IV) müalicəsində standart müalicəyə əlavə kimi

Əks göstərişlər

Spironolaktona və ya köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq
Addison xəstəliyi (böyrəküstü vəzilərin funksiyasının zəifləməsi)
Spironolakton-a qarşı keçmişdə qeyri-adi və ya allergik reaksiyanın olması
Hiperkaliemiya (qanda kaliumun səviyyəsinin yüksəlməsi)
Sidiyəgetmədə çətinlik
Kəskin və ciddi böyrək çatışmazlığı
Laktasiya dövrü
Eplerenon (xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə olunur) ilə birlikdə istifadə
Kaliumqoruyucu diüretik tablet və ya kalium əlavəsi tabletlərinin istifadəsi zamanı.
Yuxarıda göstərilən hallarda bu dərmandan istifadə etməyin.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Böyrək və ya qaraciyər xəstəliyi varsa
Hamiləlik dövründə
Qanda natriumun səviyyəsinin düşməsinə (hiponatriemiya) səbəb ola biləcək digər diüretik tabletlərlə Ridaktonun birlikdə istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bu xəbərdarlıqlar hətta keçmişdə olsa belə Sizə şamil edilə bilərsə, lütfən bu barədə həkiminizi məlumat verin.
Ridaktonun tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr barədə mühüm məlumatlar
Ridaktonun tərkibində olan köməkçi maddələrə qarşı yüksək həssaslığınız yoxdursa, bu maddələrlə bağlı qeyri-adi təsir gözlənilməz.
Böyrək çatışmazlığı olan hipertenzivli pasiyentlərdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.
Pediatrik pasiyentlərdə hiperkaliemiya riski səbəbindən ehtiyatla təyin edilməlidir.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Əgər Sizin üzərinizdə anesteziyaedici preparatdan istifadə edilməklə cərrahi əməliyyat keçiriləcəksə, həkiminizi Ridakton qəbul etdiyiniz barədə məlumat verin.
Əgər aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsizsə həkiminizin Ridaktonun dozasına düzəliş etməsi lazım gələ bilər.
Diqoksin və ya karbenoksolon,
Yüksək qan təzyiqinin müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar,
Digər diüretiklər,
Aspirin və ya ibuprofen kimi qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP),
Kalium əlavələri
Qanın laxtalanmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan heparin və ya aşagımolekullu heparin
Əgər resept əsasında və ya reseptsiz buraxılan hər hansı digər dərman istifadə edirsizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, lütfən bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkiminizi və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.
Hamiləsinizsə, hamilə ola biləcəyinizi düşünürsünüzsə və ya hamilə qalmığı planlaşdırırsınızsa, bunu həkiminize bildirin. Həkiminiz lazımlı bilərsə, Ridaktonu istifadə edə bilərsiniz. Müalicə müddətində hamilə qaldığınızı hiss etsəniz, bunu dərhal həkiminize və ya əczaçıya bildirin.
Laktasiya

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əgər südəmər uşağınız varsa Ridakton istifadə etməyin.

Əgər laktasiya dövründə Ridaktonun istifadəsi üçün zərurət yaranarsa, o zaman südəmər uşağınızın qidalanması üçün alternativ yolların təyin edilməsi üçün həkiminizlə məsləhətləşin

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Ridakton nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir göstərə bilər (yuxululuq və başgicəllənmə kimi əlamətlər yarandığı üçün). Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozasi

Ridakton daxilə qəbul edilir.

Həkiminiz və ya əczaçı başqa cür tövsiyə verməzsə, aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

Həkiminiz Sizə hansı dozada Ridakton lazıム olduğunu müəyyən edəcək. Bu doza müxtalifdir və həkiminiz Sizin üçün uyğun olan dozani seçəcəkdir. Böyükler preparati gündə 1 dəfə birdəfəlik doza şəklində və ya dozani bölünmüş şəkildə gündə bir neçə dəfəyə qəbul edə bilərlər. Qida ilə birlikdə qəbul edilməlidir.

Böyükler üçün doza 25 mq-la 200 mq. Ridakton arasında dəyişə bilər. Preparati hansı dozada qəbul edəcəyinizi əmin deyilsinzə, həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Müxtəlif yaş grupları

Uşaqlarda istifadəsi

Uşaqlar üçün doza (tabletərin sayı) onların bödən kütləsindən asılı olaraq təyin edilir. Həkiminiz uşağınız üçün lazım olan tabletərin sayını Sizə bildirəcəkdir.

Yaşlılarda istifadəsi

Həkiminiz Sizin müalicənizi aşağı doza ilə başlayacaq və lazım olan effekt əldə edilənə qədər dozani tədricən artıracaqdır.

Xüsusi hallarda istifadəsi

Böyrək çatışmazlığı

Kəskin böyrək çatışmazlığı və böyrək funksiyalarının zəifləməsi və ya pozğunluğu hallarında bu dərman preparati istifadə olunmamalıdır.

Qaraciyər çatışmazlığı

Qaraciyərin dərmanın metabolizmini və orqanizmdən xaric olmasını dəyişdirə biləcək ağır çatışmazlığı zamanı preparat ehtiyatla istifadə olunmalıdır.

Əgər Ridaktonun təsirinin çox güclü və ya çox zəif olduğunu hiss edirsinzə, bu barədə həkiminizlə və ya əczaçıya məlumat verin.

Ridaktonu istifadə etməyi unutduqda

Əgər bir dozanın qəbulunu unutmusunuzsa və növbəti dozanın vaxtına çox qalmışdırsa, onu xatırlayan kimi qəbul edin.

Unudulmuş dozani əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin.

Ridakton ilə müalicə qurtardığıdan sonra meydana çıxı biləcək təsirlər

Hətta özünüüz yaxşı hiss etsəniz həkiminiz dərmanın qəbulunu dayandırmağınız barədə qərar verməyənə qədər dərmanın qəbulunu davam etdirin.

Əgər dərmanın qəbulunu lazım olduğundan tez dayandırsanız, vəziyyətiniz pisləşə bilər.

Dərmanın qəbuluna dair suallarınız olarsa, həkiminizlə məsləhətləşin

Ridaktonun qida və içkilərlə birlilikdə istifadəsi

Ridakton qida ilə birlilikdə qəbul edilə bilər.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi, Ridaktonun tərkibində olan maddələrə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxı bilər.

Əlavə təsirlər aşağıdakı tezliyinə görə aşağıdakı kimi sadalanır.

Çox tez-tez: 10 xəstədən ən azı birində rast gələ bilər.

Tez-tez: 10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda rast gələ bilər.

Bazən: 100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda rast gələ bilər.

Nadir : 1000 xəstənin birindən azında rast gələ bilər.

Çox nadir : 10000 xəstənin birindən azında rast gələ bilər.

Məlum deyil: əldə olan məlumatlara əsasən tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, Ridaktonu istifadə etməyi dayandırın və DÖRHAL həkiminizi və ya ən yaxın xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət etmək lazımdır:

Məlum deyil:

Dodaqlarda və bədənin digər hissələrində qaşınma və qabar (Stivens-Conson sindromu)

Dərinin və gözlərin saralması (sarılıq), Ridakton qaraciyərin funksional pozğunluğuna səbəb ola bilər.

Ürəyin aritmiyası, sancma hissi, tənəffüsün tormozlanması və ya nəfəsalmanın çətinləşməsi, qanda kaliumun səviyyəsinin yüksəlməsini göstərən simptomlar meydana çıxa bilər. Həkiminiz kaliumun və digər elektrolitlərin səviyyəsinə nəzarət etmək üçün müntəzəm olaraq qan analizləri vermənizi istəyəcəkdir. Əgər lazımlı bilərsə, müalicənizi dayandırıra bilər.

Bunların hamısı çox ciddi əlavə təsirlərdir.

Əgər bunlardan hər hansı biri Sizdə mövcuddursa, təcili tibbi müdaxiləyə və ya xəstəxanaya yerləşdirilməyinizi ehtiyac yarana bilər.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, həkimə müraciət etmək lazımdır:

Məlum deyil:

Ürəkbulanma, dispepsiya

Yuxululuq, başgicəllənmə

Qadınlarda menstruasiya ilə bağlı problemlər

Qadın və kişilərdə cinsi həvəsin (libido) dəyişməsi

Orqanizmdə elektrolitlərin səviyyəsində nizamsızlıq (qanda kalsiumun səviyyəsinin yüksəlməsi)

Leykositlərin sayının azalması (leykopeniya); qanın laxtalanması prosesində iştirak edən qan hüceyrələrinin (trombositlərin) sayının azalması (trombositopeniya)

Kişilərdə döşlərin böyüməsi (ginekomastiya) (bu vəziyyət müalicə qurtardıqdan sonra keçir), sinədə yumrulaşma, sinədə ağrı

Qadınlarda səsin qalınlaşması

Dəridə qızartı, ümumi qaşınma

Övrə və qaşınmanın inkişafı ilə dəridə allergik reaksiya; həddindən artıq tüklənmə (hipertrikoz)

Sağcların tökülməsi

Ümumi yorğunluq, əzələ spazmları

Kəskin böyrək çatışmazlığı

Bunlar Ridaktonun zəif əlavə təsirləridir.

Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı bir əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Lazım olduğundan artıq Ridakton qəbul etmisinizsə, həkimlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Doza həddinin aşılmasının simptomları keyləşmə və başgicəllənmədir. Ürəkbulanma, qusma və ya diareya və başgicəllənmə baş verə bilər.

Buraxılış forması

30 örtüklü tablet, blister qablaşdırılmışda. Blisterlər içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraitü

25°C-dən aşağı temperaturda, öz qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Gen İlac ve Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
ASO 2 ve 3. OSB Alçı OSB Mah. 2013 Cad.No.24 Sincan/Ankara/Türkiyə.

Lisenziyanın sahibi

Gen İlac ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah.2119 Sok.N:3 D:2-3
06520, Çankaya/Ankara/Türkiyə.