



"29 " april 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

Bu içlik vərəqəni saxlayın. Daha sonra onu təkrar oxumağa ehtiyac duyu bilərsiniz.

Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizi və ya əczaçımıza müraciət edin.

Bu dərman şəxsən Sizin üçün təyin edilmişdir, onu başqalarına verməyin.

Bu dərmandan istifadə zamanı həkimə və ya xəstəxanaya müraciət etsəniz həkiminizi bu dərmandan istifadə etdiyinizi söyləyin.

Bu təlimatda yazılınlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizə tövsiyə olunan dozasını artıraraq və ya azaldaraq istifadə etməyin.

Əlavə təsirlərdən hər hansı biri ciddi xarakter alarsa və ya bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, lütfən həkiminizi və əczaçımıza bildirin.

RİDAKTON 50 mq örtülü tabletler
RIDAFTONE

Tərkibi

Təsireddi maddələr: 1 tabletin tərkibində 50 mq spironolakton vardır

Koməkçi maddələr: kalsium sulfat dihidrat, kroskarmelloza natrium, laktosa monohidrat, krospovidon, qarğıdalı nişastası, HPMC 606, natrium laurilsulfat, kolloidal silikon dioksid, maqnezum stearat, Opadry (II).

Təsviri

Ağ rəngli, girdə, ikitərəfli qabarıq, bir üzündə bölmə xətti olan örtülü tabletlardır.

Farmakoterapevtik qrupu

Diuretic dərman preparatı.

ATC kodu: C03DA01.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Ridakton sidikqovucu (diuretic) dərman preparatları qrupuna aiddir.

Topuqlarınızda şışkinlik varsa və ya kəsik-kəsik nəfəs alırsınızsa həkimə müraciət edin. Bu vəziyyət orqanizminizdə maye miqdarının artması ilə bağlı olaraq ürəyinizin qanı qovma gücünün (nasos funksiyasının) zəifləməsi ilə əlaqədar ola bilər. Bu vəziyyət durğunluq үrək çatışmazlığı adlandırılır. Çoxlu mayenin orqanizminizdə dövr etməsi ürəyinizin çox işləməsi deməkdir.

Həkiminiz orqanizminizdə olan artıq mayeni orqanizminizdən xaric etmək üçün Sizə Ridakton təyin edəcəkdir. Ridakton istifadə etdiyiniz zaman sidiyə getməyə daha çox ehtiyac duyacaqsınız. Beləliklə, artıq maye sidiyinizlə xaric olacaqdır.

İstifadəsinə göstərişlər

Ridakton əsasən aşağıdakı halların müalicəsi üçün istifadə olunur:
Essensial hipertensiya (səbəbi məlum olmayan hipertensiya)
Nefrotik sindrom (organizmdə çoxlu miqdarda mayenin toplanmasına səbəb olan böyrək xəstəliyi)
Assit (məsələn, qarın boşluğununda qaraciyər sirrozunun səbəb olduğu maye toplanması)
Birincili aldosteronizm (Aldosteron hormonunun səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq organizmdə mayenin toplanması)
Diüretiklərlə birlikdə hipokaliemiya/hipomaqneziemiyanın (qanda kalium səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi) kompleks müalicəsində
Zəif-orta-ciddi simptomlarla müşahidə olunan ürək çatışmazlığının (NYHA II-IV) müalicəsində standart müalicəyə əlavə kimi

Əks göstərişlər

Spironolaktona və ya köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq
Addison xəstəliyi (böyrüküstü vəzilərin funksiyasının zəifləməsi)
Spironolakton-a qarşı keçmişdə qeyri-adi və ya allergik reaksiyanın olması
Hiperkaliemiya (qanda kaliumun səviyyəsinin yüksəlməsi)
Sidiyəgetmədə çətinlik
Kəskin və ciddi böyrək çatışmazlığı
Laktasiya dövrü
Eplerenon (xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsi üçün istifadə olunur) ilə birlikdə istifadə
Kaliumqoruyucu diüretik tablet və ya kalium əlavəsi tabletlərinin istifadəsi zamanı.
Yuxarıda göstərilən hallarda bu dərmandan istifadə etməyin.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Böyrək və ya qaraciyər xəstəliyi varsa
Hamiləlik dövründə
Qanda natriumun səviyyəsinin düşməsinə (hiponatriemiya) səbəb ola biləcək digər diuretic tabletlərlə Ridaktonun birlikdə istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Bu xəbərdarlıqlar hətta keçmişdə olsa belə Sizə şamil edilə bilərsə, lütfən bu barədə həkiminizi məlumat verin.
Ridaktonun tərkibində olan bazı köməkçi maddələr barədə mühüm məlumatlar
Ridaktonun tərkibində olan köməkçi maddələrə qarşı yüksək həssaslığınız yoxdur, bu maddələrlə bağlı qeyri-adi təsir gözlənilməz.
Böyrək çatışmazlığı olan hipertenzivli pasiyentlərdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.
Pediatrik pasiyentlərdə hiperkaliemiya riski səbəbindən ehtiyatla təyin edilməlidir.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Əgər Sizdən üzərinizdə anesteziyaedici preparatdan istifadə edilməklə cərrahi əməliyyat keçiriləcəksə, həkiminizə Ridakton qəbul etdiyiniz barədə məlumat verin.
Əgər aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsizsə həkiminizin Ridaktonun dozasına düzəliş etməsi lazım gələ bilər.
Diqoksin və ya karbenoksolon,
Yüksək qan təzyiqinin müalicəsi üçün istifadə olunan dərmanlar,
Digər diureticlər,
Aspirin və ya ibuprofen kimi qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP),
Kalium əlavələri
Qanın laxtalanmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan heparin və ya aşağımolekullu heparin
Əgər resept əsasında və ya reseptsiz buraxılan hər hansı digər dərman istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmisinizsə, lütfən bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Dərmani istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Hamiləsinizsə, hamilə ola biləcəyinizi düşünürsünüzsə və ya hamilə qalmağı planlaşdırırsınızsa, bunu həkiminizə bildirin. Həkiminiz lazımlı bilərsə, Ridaktonu istifadə edə bilərsiniz. Müalicə müddətində hamilə qaldığınızı hiss etsəniz, bunu dərhal həkiminizə və ya əczaçıya bildirin.

Laktasiya

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əgər südəmər uşağınız varsa Ridakton istifadə etməyin.

Əgər laktasiya dövründə Ridaktonun istifadəsi üçün zərurət yaranarsa, o zaman südəmər uşağınızın qidalanması üçün alternativ yolların təyin edilməsi üçün həkiminizlə məsləhətləşin.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Ridakton nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir göstərə bilər (yuxululuq və başgicəllənmə kimi əlamətlər yarandığı üçün). Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır.

İstifadə qaydası və dozasi

Ridakton daxilə qəbul edilir.

Həkiminiz və ya əczaçı başqa cür tövsiyə verməzsə, aşağıdakı təlimatlara əməl edin.

Həkiminiz Sizə hansı dozada Ridakton lazım olduğunu müəyyən edəcək. Bu doza müxtəlifdir və həkiminiz Sizin üçün uyğun olan dozani seçəcəkdir. Böyükler preparati gündə 1 dəfə birdəfəlik doza şəklində və ya dozani bölünmüş şəkildə gündə bir neçə dəfəyə qəbul edə bilərlər. Qida ilə birlikdə qəbul edilməlidir.

Böyükler üçün doza 25 mq-la 200 mq. Ridakton arasında dəyişə bilər. Preparati hansı dozada qəbul edəcəyinizi əmin deyilsinizsə, həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Müxtəlif yaş grupları

Uşaqlarda istifadəsi

Uşaqlar üçün doza (tabletərin sayı) onların bədən kütləsindən asılı olaraq təyin edilir. Həkiminiz uşağınız üçün lazım olan tabletərin sayını Sizə bildirəcəkdir.

Yaşlılarda istifadəsi

Həkiminiz Sizin müalicənizi aşağı doza ilə başlayacaq və lazım olan effekt əldə edilənə qədər dozani tədricən artıracaqdır.

Xüsusi hallarda istifadəsi

Böyrək çatışmazlığı

Kəskin böyrək çatışmazlığı və böyrək funksiyalarının zəifləməsi və ya pozğunluğu hallarında bu dərman preparati istifadə olunmamalıdır.

Qaraciyər çatışmazlığı

Qaraciyərin dərmanın metabolizmini və organizmdən xaric olmasına dəyişdirə biləcək ağır çatışmazlığı zamanı preparat ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Əgər Ridaktonun təsirinin çox güclü və ya çox zəif olduğunu hiss edirsizsə, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Ridaktonu istifadə etməyi unutduqda

Əgər bir dozanın qəbulunu unutmusunuzsa və növbəti dozanın vaxtına çox qalmışdırsa, onu xatırlayan kimi qəbul edin. Unudulmuş dozani əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin.

Ridakton ilə müalicə qurtardıqdan sonra meydana çıxa biləcək təsirlər

Hətta özünüzü yaxşı hiss etsəniz həkiminiz dərmanın qəbulunu dayandırmağınız barədə qərar verməyənə qədər dərmanın qəbulunu davam etdirin.

Əgər dərmanın qəbulunu lazım olduğundan tez dayandırsanız, vəziyyətiniz pisləşə bilər.

Dərmanın qəbuluna dair suallarınız olarsa, həkiminizlə məsləhətləşin.

Ridaktonun qida və içkilərlə birlikdə istifadəsi

Ridakton qida ilə birlikdə qəbul edilməlidir.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi, Ridaktonun tərkibində olan maddələrə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxa bilər.

Əlavə təsirlər tezliyinə görə aşağıdakı kimi sadalanır.

Çox tez-tez: 10 xəstədən ən azı birində rast gələ bilər.

Tez-tez: 10 xəstənin birindən azı, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda rast gələ bilər.

Bəzən : 100 xəstənin birindən azı, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda rast gələ bilər.

Nadir : 1000 xəstənin birindən azıda rast gələ bilər.

Çox nadir : 10000 xəstənin birindən azıda rast gələ bilər.

Məlum deyil: əldə olun məlumatlara əsasən tezliyi qiymətləndirmək mümkün deyil.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, Ridaktonu istifadə etməyi dayandırın və DƏRHAL həkiminizi və ya ən yaxın xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət etmək lazımdır:

Məlum deyil:

Dodaqlarda və bədənin digər hissələrində qaşınma və qabar (Stivens-Conson sindromu)

Dərinin və gözlərin saralması (sarılıq), Ridakton qaraciyərin funksional pozğunluğuna səbəb ola bilər.

Ürəyin aritmiyası, sancma hissi, tənəffüsün tormozlanması və ya nəfəsalmanın çatınlığı, qanda kaliumun səviyyəsinin yüksəlməsini göstərən simptomlar meydana çıxa bilər. Həkiminiz kaliumun və digər elektrolitlərin səviyyəsinə nəzarət etmək üçün müntəzəm olaraq qan analizləri vermənizi istəyəcəkdir. Əgər lazımlı bilərsə, müalicənizi dayandırıra bilər.

Bunların hamısı çox ciddi əlavə təsirlərdir.

Əgər bunlardan hər hansı biri Sizdə mövcuddursa, təcili tibbi müdaxiləyə və ya xəstəxanaya yerləşdirilməyinizi ehtiyac yarana bilər.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, həkimə müraciət etmək lazımdır:

Məlum deyil:

Ürəkbulanma, dispəpsiya

Yuxululuq, başgicəllənmə

Qadınlarda menstruasiya ilə bağlı problemlər

Qadın və kişilərdə cinsi həvəsin (libido) dəyişməsi

Orqanizmdə elektrolitlərin səviyyəsində nizamsızlıq (qanda kalsiumun səviyyəsinin yüksəlməsi)

Leykositlərin sayının azalması (leykopeniya); qanın laxtalanması prosesində iştirak edən qan hüceyrələrinin (trombositlərin) sayının azalması (trombositopeniya)

Kişilərdə döşlərin böyüməsi (ginekomastiya) (bu vəziyyət müalicə qurtardıqdan sonra keçir), sinədə yumrulaşma, sinədə ağrı

Qadınlarda səsin qalınlaşması

Dəridə qızartı, ümumi qaşınma

Övrə və qaşınmanın inkişafı ilə dəridə allergik reaksiya; həddindən artıq tüklənmə (hipertrikoz)

Sağcların tökülməsi

Ümumi yorğunluq, əzələ spazmları

Kəskin böyrək çatışmazlığı

Bunlar Ridaktonun zəif əlavə təsirləridir.

Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı bir əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizi və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Lazımlı olduğundan artıq Ridakton qəbul etmisinizsə, həkimlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Doza həddinin aşılması simptomları keyləşmə və başgicəllənmədir. Ürəkbulanma, qusma və ya diareya və başgicəllənmə baş verə bilər.

Buraxılış forması

30 örtülü tablet blister qablaşdırılmışdır. Blisterlər içlik vərəqə ilə birlikdə karton kutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraitü

25°C-dən aşağı temperaturda, öz qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
Gen İlac ve Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
ASO 2 ve 3. OSB Alıcı OSB Mah. 2013 Cad.No.24 Sincan/Ankara/Türkiyə.

Lisenziyanın sahibi
Gen İlac ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah.2119 Sok.N:3 D:2-3
06520, Çankaya/Ankara/Türkiyə.