

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev

“10” sentyabr 2019-cu il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəni diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

- *Bu içlik vərəqəni saxlayın. Daha sonra onu təkrar oxumağa ehtiyac duya bilərsiniz.*
- *Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizə və ya əczaçıya müraciət edin.*
- *Bu dərman xüsusi olaraq Sizin üçün yazılmışdır, onu başqalarına verməyin.*
- *Bu dərmandan istifadə zamanı həkimə və ya xəstəxanaya müraciət etsəniz həkiminizə bu dərmandan istifadə etdiyinizi söyləyin.*
- *Bu təlimatda yazılanlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizə tövsiyə olunan dozasını artıraraq və ya azaldaraq istifadə etməyin.*
- *Əlavə təsirlərdən hər hansı biri ciddi xarakter alarsa və ya bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, lütfən həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin.*

ROZVAKS 40 mq örtüklü tabletlər
ROSVAKS

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Rosuvastatin

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 40 mq rozuvastatinə ekvivalent miqdarda rozuvastatin-kalsium vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokrstallik sellüloza 200, laktoza DC monohidrat, susuz natrum karbonat, kros повідон, maqnezium stearat, Opadry AMB 80 W34464 çəhrayı.

Təsviri

Rozvaks uzunsov, çəhrayı rəngli örtüklü tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu

Hipolipidemik vasitə. Statinlər.

ATC kodu: C10AA07.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

ROZVAKS 40 mq örtüklü tabletlər, “statinlər” adlandırılan farmakoloji qrupa daxil olan dərman vasitəsidir.

Həkiminiz tərəfindən Sizə ROZVAKS yazılmışdırsa, deməli Sizdə xolesterinin səviyyəsi yüksəkdir. Yəni ürək tutması və insult riski daşıyırsınız.

Xolesterin səviyyənizi düzəltmək üçün qidalanma tərzinizi dəyişdirməyiniz və fiziki məşqlər etməyiniz kifayət etmədiyindən həkiminiz Sizə ROZVAKS təyin etmişdir. ROZVAKS qəbul etdiyiniz müddətdə xolesterinin səviyyəsini aşağı salan pəhrizinizi və fiziki məşqlərinizi davam etdirməlisiniz, əks təqdirdə ürək tutmalarının başverməsi, insult və ya onlarla bağlı digər sağlamlıq problemləri riskinizi artıran faktorlara sahib olmuş olursunuz. Ürək tutması, insult və ya digər problemlər ateroskleroz adlandırılan bir xəstəliyin nəticəsi ola bilər. Aterosklerozun səbəbi damarlarınızda yağ qalıqlarının yığılaraq kirecləşməsidir.

ROZVAKS, qanda olan, lipid adlandırılan maddələrin səviyyəsini tənzimləmək üçün istifadə olunur. Qanda olan lipidlərin ən məşhuru xolesterindir.

Qanda olan xolesterinin müxtəlif növləri vardır. "Pis" xolesterin ("ASLP-X" – aşağı sıxlıqlı lipoprotein xolesterini) və "yaxşı" xolesterin ("YSLP-X"- yüksək sıxlıqlı lipoprotein xolesterini).

- ROZVAKS "pis" xolesterini azaldır, "yaxşı" xolesterini artırır.
- Orqanizminizin "pis" xolesterin sintez etməsinin qarşısını almaq və "pis" xolesterinin qandan xaric edilməsi üçün orqanizminizə yardımçı olur.

İnsanların çoxu, yüksək xolesterinin onlara təsir etmədiyini düşünürlər, çünki, bu vəziyyətlə bağlı hər hansı bir əlamət hiss etmirlər. Amma, bu vəziyyət müalicə olunmazsa yağ qalıqları qan damarlarınızın divarlarında toplanaraq kirecləşir və damarlarınızı daraldır.

Bəzən daralan bu damarlar tutula bilər. Ürəyə və ya beyinə qan getməzsə, miokard infarktı və ya insult baş verə bilər. Xolesterinin səviyyəsini aşağı salmaqla ürək tutmalarının və insultun başvermə və ya bunlarla bağlı digər sağlamlıq problemləri riskinizi azaltmış olursunuz.

Xolesterininiz lazım olan səviyyəyə düşsə belə, ROZVAKS qəbul etməyi davam etdirməyiniz zəruridir. Çünki, ROZVAKS xolesterinin səviyyəsini yenidən yüksəlməsinə və damarlarda kirecləşməsinə mane olur. Yalnız, həkiminiz bu dərmanın qəbulunu dayandırmanızı məsləhət bildiyi və ya hamilə qaldığınız zaman ROZVAKS-ın qəbulunu dayandırmalısınız.

İstifadəsinə göstərişlər

- Yüksək xolesterin səviyyəsini aşağı salmaq üçün.
- Miokard infarktı və insult və ya onunla bağlı sağlamlıq problemlərinin riskini azaltmaq üçün.

ROZVAKS, anamnezdə ailəvi xolesterin səviyyəsini yüksək olması bildirilən 10-17 yaşlı uşaqlarda da istifadə oluna bilər.

Əks göstərişlər

- ROZVAKS-a və ya preparatın tərkibində olan maddələrin hər hansı birinə qarşı əvvəllər Sizdə allergiya baş vermişdirsə,
- Hamiləsinizsə və ya uşaq əmizdirirsinizsə. ROZVAKS-la müalicə müddətində hamilə qalsanız, dərmanın qəbulunu dərhal dayandırın və həkiminizə müraciət edin. ROZVAKS qəbul edən qadınlar müvafiq qorunma üsulundan istifadə etməklə hamilə qalmaqdan qaçmalıdırlar.
- Qaraciyər xəstəliyiniz varsa,
- Ciddi böyrək problemləriniz varsa,
- Təkrarlanan və ya səbəbi məlum olmayan əzələ ağrıları və ya sancı varsa,
- Siklosporin adlandırılan dərman qəbul edirsinizsə (bu dərman orqan köçürülməsindən sonra istifadə olunur).

Yuxarıda sadalanan hallardan hər hansı biri Sizdə varsa və ya olduğuna şübhəniz varsa, lütfən həkiminizə müraciət edin.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

ROZVAKS 40 mq-ı (ən yüksək doza) aşağıdakı hallarda İSTİFADƏ ETMƏYİN

- Orta dərəcəli böyrək probleminiz varsa (şübhəniz varsa, həkiminizə söyləyin),
- Qalxanabənzər vəzinizin çatışmazlığı varsa,
- Təkrarlanan və ya mənşəyi məlum olmayan əzələ ağrılarınız və ya sancınız varsa (anamnezdə şəxsi və ya ailəvi əzələ problemləri və ya anamnezdə əvvəllər digər xolesterin azaldıcı dərmanlar qəbul etdiyiniz zaman yaranan əzələ problemləriniz olmuşdursa),
- Davamlı olaraq və yüksək miqdarda alkoqol qəbul edirsinizsə,
- Asiya mənşəlisinizsə (yapon, çinli, filippinli, vyetnamlı, koreyalı və hindli),
- Xolesterininizi aşağı salmaq üçün fibratlar adlandırılan dərmanlar qəbul edirsinizsə,

- Yaşınız 18-dən aşağıdırsa.

Yuxarıda sadalanan hallardan hər hansı biri Sizde varsa və ya olduğuna şübhəniz varsa, lütfən həkiminizə müraciət edin.

ROZVAKS-ı aşağıdakı hallarda ehtiyatla istifadə edin

- Böyrəklərinizdə problem varsa,
- Qaraciyərinizdə problem varsa,
- Anamnezdə təkrarlanan və mənşəyi məlum olmayan əzələ ağrıları və ya sancı, Sizde və ya ailənizdə anamnezdə əzələ problemləri və ya digər xolesterin salıcı (hipoxolesterinemik) dərmanları qəbul edərkən, onların qəbulu ilə əlaqədar əzələ problemləri baş vermişdirsə. Xüsusilə özünüzi yaxşı hiss etmirsinizsə və ya qızdırmanız varsa, mənşəyi məlum olmayan əzələ ağrıları və ya sancı hiss etsəniz, dərhal və mütləq həkiminizə müraciət etməlisiniz.
- Davamlı olaraq və yüksək miqdarda alkoqol qəbul edirsinizsə,
- Qalxanabənzər vəzinizin çatışmazlığı varsa,
- Xolesterininizi aşağı salmaq üçün fibratlar adlandırılan dərmanlar qəbul edirsinizsə, lütfən, yüksək xolesterinə qarşı digər dərmanları əvvəllər qəbul etmiş olsanız belə, bu içlik vərəqədə dərmanın istifadəsinə dair təlimatı diqqətlə oxuyun.
- Xəstə 10 yaşdan kiçik uşağıdırsa: ROZVAKS 10 yaşdan aşağı uşaqlarda istifadə olunmamalıdır.
- Xəstənin yaşı 18-dən aşağıdırsa: ROZVAKS 40 mq tablet uşaqlarda və yaşı 18-dən aşağı olan yeniyetmələrdə istifadə üçün münasib deyildir.
- Yaşınız 70-dən yuxarıdırsa (həkiminiz ROZVAKS-ın sizə uyğun olan başlangıç dozasını müəyyən etməlidir),
- Ağır tənəffüs çatışmazlığınız varsa,
- Şəkərli diabet xəstəliyiniz varsa və ya şəkərli diabetlə bağlı risk daşıyırsınızsa,
- Asiya mənşəlisinizsə (yapon, çinli, filippinli, vyetnamlı, koreyalı və hindli). Həkiminiz ROZVAKS-ın sizə uyğun olan başlangıç dozasını müəyyən etməlidir,

Yuxarıda sadalanan bu hallardan hər hansı biri sizdə varsa və ya olmasını düşünürsünüzsə, 40 mq-lıq doza (ən yüksək doza) istifadə etməyin. ROZVAKS-ın hər hansı bir dozasını qəbul etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçınızla məsləhətləşin.

Bəzi insanlarda statinlər qaraciyərə təsir göstərir. Belə bir vəziyyətin yaranıb-yaranmadığını sadə qan analizi ilə (qaraciyər fermentlərinin səviyyəsi) müəyyən etmək olar. Bununla bağlı həkiminiz, ROZVAKS qəbul etməyə başlamazdan əvvəl və qəbul edərkən qaraciyər funksiyalarının müəyinə edilməsi üçün analiz məsləhət görəcəkdir.

Bu hallar hətta keçmişdə olsa belə Sizə aiddirsə, lütfən həkiminizə bildirin.

ROZVAKS-ın tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr haqqında mühüm məlumatlar

Əgər həkiminiz Sizde bəzi şəkərlərə qarşı dözümsüzlüyün olduğunu bildirmişdirsə, bu preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə əlaqə saxlayın.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Əgər reseptlə və ya reseptsiz buraxılan hər hansı dərmanı hazırda istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmişinizsə, lütfən, bu barədə həkiminizə və ya əczaçınıza məlumat verin.

Bu dərmanlardan hər hansı birini qəbul edirsinizsə, həkiminizə bildirin:

siklosporin (məsələn, orqan köçürülməsindən sonra), varfarin (və ya bir başqa antikoagulyant dərman vasitəsi), fibratlar (hemfibrozil, fenofibrat kimi), digər hipoxolesterinemik (xolesterin azaldıcı) dərmanlar (ezetimib kimi), həzm pozğunluğu zamanı istifadə olunan preparatlar (mədə turşuluğunu aradan qaldırmaq üçün istifadə edilir), eritromisin (antibiotik), doğuşa nəzarət tableti, hormonəvəzedici müalicə, lopinovir/ritonavir (İİV infeksiyasının müalicəsi üçün istifadə olunur). ROZVAKS bu dərmanların təsirini dəyişdirə bilər və ya bu dərmanlar ROZVAKS-ın təsirini dəyişdirə bilər.

Əgər reseptlə və ya reseptsiz buraxılan hər hansı dərmanı hazırda istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmişinizsə, lütfən, bu barədə həkiminizə və ya əczaçınıza məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Hamiləsinizsə, ROZVAKS istifadə etməyin. ROZVAKS istifadə edən qadınlar münasib qorunma vasitələri ilə hamilə qalmaqdan qaçmalıdırlar.

Müalicə dövründə hamilə olduğunuzu hiss etsəniz, bunu dərhal həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin.

Laktasiya

Dərmanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşin.

Əgər uşaq əmizdirirsinizsə, ROZVAKS qəbul etməyin.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Çox insan ROZVAKS qəbul edərkən maşın və mexanizmləri idarə edə bilər, çünki, ROZVAKS bu insanların qabiliyyətlərinə təsir etmir. Bununla belə, bəzi insanlar ROZVAKS qəbul edərkən başgicəllənmə hiss edə bilər. Əgər başgicəllənmə hiss etsəniz, nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.

İstifadə qaydası və dozası

ROZVAKS-ı hər zaman həkiminizin tövsiyə etdiyi kimi qəbul edin. Əmin deyilsinizsə, həkiminizdən və ya əczaçıңызdan soruşun.

Tableti bütöv şəkildə su ilə udun.

ROZVAKS-ı gündə bir dəfə qəbul edin. ROZVAKS-ı günün hər hansı vaxtında qəbul edə bilərsiniz.

ROZVAKS tabletinin qəbulunu unutmamaq üçün onu hər gün eyni saatda qəbul etməyə fikir verin.

Böyüklər üçün normal dozalar

ROZVAKS-ı yüksək xolesterin səviyyəsini aşağı salmaq üçün qəbul edirsinizsə:

Başlanğıc doza

ROZVAKS ilə müalicə, əgər əvvəllər hər hansı bir statin istifadə edilmişdirsə - 5 mq doza ilə, əgər əvvəllər başqa bir statin istifadə edilməmişdirsə - 5 mq və ya 10 mq doza ilə başlanmalıdır. Başlanğıc dozanın seçilməsi aşağıdakı hallardan asılıdır:

- Xolesterinin səviyyəsi,
- Ürək tutması və ya insult keçirmə riskinin mövcudluğu,
- Mümkün əlavə təsirlərə səbəb ola biləcək özəlliyin olub-olmaması.

Həkiminizlə ROZVAKS-ın Sizə ən uyğun olan başlanğıc dozası barədə məsləhətləşin.

Aşağıdakı hallarda həkiminiz Sizə ən aşağı doza, yəni 5 mq təklif edə bilər:

- Asiya mənşəlisinizsə (Yapon, Çinli, Filippinli, Vyetnamlı, Koreyalı və Hindli),
- Yaşınız 70-dən yuxarıdırsa,
- Orta dərəcəli böyrək probleminiz varsa,
- Əzələ ağrıları və sancıları yaşama riskiniz varsa (miopatiya).

Dozanın artırılması və ən yüksək gündəlik doza

Həkiminiz dozanın artırılmasına qərar verə bilər. Beləliklə Sizin üçün ən münasib dozadan istifadə edə bilərsiniz.

Əgər müalicəyə 5 mq doza ilə başlamısınızsa, həkiminiz dozanı əvvəlcə 10 mq-a, daha sonra 20 mq-a, lazım gələrsə, hətta 40 mq-a çatdıra bilər. Dozanın hər yüksəldilməsi 4 həftəlik intervallarla həyata keçirilir.

ROZVAKS-ın ən yüksək gündəlik dozası 40 mq-dır. Bu doza adətən, xolesterin səviyyəsi yüksək və ürək tutmaları və insult riski yüksək olan, eyni zamanda 20 mq doza ilə xolesterininin səviyyəsi kifayət dərəcədə düşməyən xəstələr üçündür.

ROZVAKS-ı ürək tutmalarının baş verməsini, insult və ya onunla bağlı sağlq problemlərinizin riskini azaltmaq üçün istifadə edirsinizsə

Tövsiyə edilən doza gündə 20 mq-dır. Bununla birlikdə, Sizdə yuxarıda göstərilən faktorlardan hər hansı biri varsa, həkiminiz daha aşağı dozadan istifadə etməyinizə qərar verə bilər.

10-17 yaş arası uşaqlar üçün normal dozalar

Normal başlanğıc doza 5 mq-dır. Həkiminiz Sizin üçün ROZVAKS-ın ən uyğun dozasını tapmaq üçün dozanızı arıra bilər. ROZVAKS-ın ən yüksək gündəlik dozası 20 mq-dır. Dozanızı gündə bir dəfə qəbul edin. ROZVAKS 40 mq uşaqlarda istifadə olunmamalıdır.

Xolesterinin səviyyəsinə müntəzəm nəzarətlər:

Xolesterinin səviyyəsinə müntəzəm olaraq nəzarət etmək üçün həkiminizin yanına getməyiniz çox vacibdir. Bu yolla Siz, xolesterininizin lazım olan səviyyəyə düşdüyünə və bu səviyyədə qaldığına əmin ola bilərsiniz.

Həkiminiz qəbul edəcəyiniz dozanı artırma bilər. Beləliklə, Siz ROZVAKS-ın Sizin üçün ən uyğun dozasını ala bilərsiniz.

Əgər ROZVAKS-ın təsirinin çox güclü və ya zəif olduğunu müşahidə etsəniz, bunu həkiminizə və ya əczaçınıza bildirin.

ROZVAKS-ın qida və içkilərlə birlikdə qəbulu

ROZVAKS-ı acqarına və ya yeməkdən sonra qəbul edə bilərsiniz.

ROZVAKS-ı qəbul etməyi unutmusunuzsa

Əgər ROZVAKS qəbul etməyi unutmusunuzsa, narahat olmayın, növbəti dozanı öz vaxtında qəbul edin.

Unudulan dozanı əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin.

ROZVAKS ilə müalicənin dayandırılması zamanı meydana çıxma biləcək təsirlər

ROZVAKS-ın qəbulunu dayandırmaq istəyirsinizsə, həkiminizlə məsləhətləşin. ROZVAKS-ı qəbul etməyi dayadırsanız, xolesterinin səviyyəsi yenidən yüksələ bilər.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi, ROZVAKS-ın tərkibində olan maddələrə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxma bilər. Bu əlavə təsirlərin nədən ibarət olmasını bilməyiniz vacibdir. Əlavə təsirlər ümumilikdə zəif olur və keçici xarakter daşıyır.

Aşağıdakı əlavə təsirlərdən hər hansı biri meydana çıxarsa, ROZVAKS-ın qəbulunu dayandırın və **DƏRHAL** həkiminizə məlumat verin və ya Sizə ən yaxın olan xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət edin:

- Üzdə, dodaqlarda, dildə və/və ya boğazda şişkinliklə (ödemlə) birlikdə və ya şişkinlik olmadan baş verən tənəfəslik,
- Üzdə, dodaqlarda, dildə və/və ya boğazda şişkinlik və bununla bağlı udmanın çətinləşməsi
- Dəridə səpgi və güclü qaşınma.

Əzələlərinizdə gözlədiyinizdən daha uzun sürən qeyri-adi ağrı və ya sancı varsa, ROZVAKS-ın qəbulunu dayandırın və dərhal həkiminizə müraciət edin. Əzələlərdə hiss edilən bu simptomlar uşaq və yeniyetmələrdə böyüklərə nisbətən daha çox rast gəlinir. Digər statinlərdə olduğu kimi, çox az sada insanda əzələlərdə narahatlıq yaradan təsirlər meydana çıxma bilər. Bu təsirlər nadir hallarda rəbdomioliz adlandırılan və həyat üçün təhlükəli olan əzələ zədələnməsinə qədər inkişaf edə bilər.

Çox ciddi ola bilən belə hallarla qarşılaşdıqda həkiminizə müraciət edin. Bu çox ciddi əlavə təsirlərin hamısı çox nadir hallarda meydana çıxır.

Əlavə təsirlər aşağıdakı kateqoriyalarda göstərildiyi kimi sadalanmışdır:

Çox tez-tez: 10 xəstənin ən azı birində meydana çıxma bilər.

Tez-tez: 10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxma bilər.

Bəzən: 100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən çoxunda meydana çıxma bilər.

Nadir hallarda: 1000 xəstənin birindən azında meydana çıxma bilər.

Çox nadir hallarda: 10 000 xəstənin birindən azında meydana çıxma bilər.

Tez-tez

Aşağıdakılardan hər hansı birini hiss etsəniz, həkiminizə söyləyin:

- Baş ağrısı,
- Qarın ağrısı
- Qəbizlik,
- Nasazlıq,
- Əzələlərdə ağrı,
- Zəiflik,
- Başgicəllənmə,
- Sidikdə zülalın artması. Bu hal ümumiyyətlə ROZVAKS-ın qəbulu dayandırılmadan da öz-özünə normal vəziyyətə döndür (tez-tez adətən ROZVAKS 40 mq üçün).
- Digər HMG-KoA reduktaza inhibitorlarında da olduğu kimi rozuvastatin ilə müalicə alan xəstələrdə də HbA1C və qan şəkəri səviyyəsində yüksəlmə müşahidə oluna bilər.

Bəzən:

- Səpgi, qaşınma və ya digər dəri reaksiyaları
- Sidikdə zülalın artması. Bu hal ümumiyyətlə ROZVAKS-ın qəbulu dayandırılmadan da öz-özünə normal vəziyyətə döndür (adətən ROZVAKS 5 mq, 10 mq və 20 mq üçün).

Nadir:

- *Güclü allergik təsirlər:* üzdə, dodaqda, dildə və/və ya boğazda şişkinlik, udmanın və nəfəsalmanın çətinləşməsi, səpgilərlə müşayiət olunan dəri qaşınması. Allergiya baş verdiyi halda, ROZVAKS-ın qəbulunu DƏRHAL dayandıraraq, tibbi yardım üçün müraciət edin.
- *Böyüklərdə əzələlərin zədələnməsi:* əzələlərinizdə gözlədiyinizdən daha uzun sürən qeyri-adi ağrı və ya sancı varsa, ROZVAKS-ın qəbulunu DƏRHAL dayandırın və həkiminizə müraciət edin.
- Güclü qarın ağrısı (mədəaltı vəzinin iltihabı),
- Qanda qaraciyər fermentlərinin səviyyəsinin artması.

Çox nadir:

- Sarılıq (dəridə və gözlərdə saralma),
- Hepatit (qaraciyərin iltihabı),
- Sidikdə qan,
- Əl və ayaq sinirlərində zədələnmə (hissizlik kimi),
- Oynaq ağrısı,
- Yaddaşın itməsi.

Tezliyi məlum olmayan əlavə təsirlər

- Diareya (ishal),
- Stivens-Conson sindromu (ağızda, gözlərdə, dəridə və genital nahiyədə ciddi ölçüdə səpgilərin olması),
- Öskürək,
- Təngnəfəslik,
- Ödem (şişkinlik),
- Yuxusuzluq və qorxulu yuxugörmələr kimi yuxu pozğunluqları,
- Cinsi problemlər,
- Depressiya,
- Davamlı öskürək və/və ya təngnəfəslik və ya qızdırma ilə müşayiət olunan tənəffüs problemləri.

Əgər bu içlik vərəqədə (istifadə üçün təlimatda) qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Əgər lazım olduqundan artıq miqdarda ROZVAKS qəbul etmisinizsə, həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin. Xəstəxanaya gedərkən və ya başqa bir səbəbdən müalicə alarkən, müalicənizlə məşğul olan tibbi personala ROZVAKS qəbul etdiyinizi söyləyin.

Buraxılış forması

ROZVAKS 40 mq, 28 örtüklü tablet blister qablaşdırmada təqdim edilir. Blisterlər içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı otaq temperaturunda, öz qutusunda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə istifadə etmədiyiniz ROZVAKS-ı çirkab sularına və ya məişət tullantılarının içərisinə atmayın. Bu barədə əczaçınızla məsləhətləşin.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Yararlılıq müddəti göstərilən ayın son gününə şamil edilir.

Yararlılıq müddəti bitmiş və ya daha istifadə etməyəcəyiniz dərmanı əczaçınıza verin.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

Gen İlaç ve Sağlq Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.

ASO 2 ve 3. OSB Alcı OSB Mah. 2013 Cad.No.24 Sincan/Ankara/Türkiyə

Lisenzianın sahibi

Gen İlac ve Saęlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Mustafa Kemal Mah.2119 Sok.N:3 D:2-3
06520, Çankaya/Ankara/Türkiye